ピコキシストロビン水和剤 <b>メジャーフロアブル</b>	取扱メーカー: 日農 原体メーカー: デュポン
成分: ピコキシストロビン〔ストロビルリン系〕22.5%	性状:類白色水和性粘稠懸濁液体 毒性:普通物 消防法:——

### 

- ●適用の病害に対して、耐性菌の影響が少なく、 使いやすい汎用殺菌剤である。
- ●幅広い病害に効果があり、作物がきれいに仕上 がる。
- 浸達性、浸透移行性が高く、耐雨性や効果持続性に優れるため、安定した防除効果を発揮する。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一 覧表」を参照。

### 【使用上のポイント】……………

●薬剤耐性菌の出現を防ぐため、過度の連用はさけ、なるべく作用性の異なる薬剤と組み合わせて 輪番で使用する。

## 【薬効・薬害等の注意】 …………

- ●浸透性を高める効果のある展着剤を加用すると 薬害を生じるおそれがあるので、展着剤加用に 当っては事前にその適否を確認する。
- ●根深ねぎに散布する場合,生育初期に散布すると株の開帳や葉身部のわん曲の薬害を生じるおそれがあるので、使用をさける。
- ●適用作物(キャベツ,はくさい,非結球レタス, ねぎ,たまねぎ,きく)の薬害などの注意は「薬 害注意事項解説」を参照。
- ●共通注意事項の8. 適用作物群に関する注意事項を参照。

## 【安全対策上の注意】 ……………

- ●蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはか からないようにする。
- ●眼に対して弱い刺激性がある。
- 魚類に影響を及ぼすおそれがあるので使用時は 注意。

# 

作物名	適用病害名	希釈倍数	10 a 当り 使用液量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用方法	ピコキシストロビンを 含む農薬の総使用回数
キャベツ	株腐病 菌核病 べと病						
はくさい	べと病 黒斑病 白斑病 白さび病			3日前まで			
レ タ ス 非結球レタス	べと病 菌核病 灰色かび病 すそ枯病	2000倍	100 ~ 300 ℓ		- 3回以内	散布	3回以内
たまねぎ	べと病 灰色かび病 灰色腐敗病 小菌核病 黒かび病			前日まで			
ね ぎ	さび病 べと病 黒斑病 葉枯病						
だいこん	白さび病 ワッカ症			3日前まで			
かぶ	白さび病						
ブロッコリー	菌核病 べと病 黒すす病			前日まで			
にんにく	さび病	2000~ 3000倍		抽苔始め〜 収穫前日 まで			
にら	白斑葉枯病						
アスパラガス	茎枯病 斑点病			前日まで			
にんじん	黒葉枯病	2000倍		3日前まで			
やまのいも	葉渋病 炭疽病			前日まで			
あ ず き いんげんまめ	灰色かび病 菌核病			3日前まで			
きく	白さび病			発病初期			
トルコギキョウ	斑点病			)E3K3:[2J75]			