

<p>クロラントラニブロール・トリフルメゾピリム・イソチアニル・ペンフルフェン粒剤</p> <p><b>スクラム箱粒剤</b></p>	<p>取扱メーカー： 北興</p> <p>原体メーカー： FMC，全農・デュポン， 住友化学・バイエル，バイエル</p>
<p>成分：クロラントラニブロール〔アントラニリックジアミド系〕…0.75% トリフルメゾピリム〔メソイオン系〕……………0.75% イソチアニル〔チアジアゾールカルボキサミド系〕…2.0% ペンフルフェン〔アルキルアミド系〕……………2.0%</p>	<p>性状：淡黄緑色細粒</p> <p>毒性：普通物</p> <p>消防法：—</p>

【適用と使用法】.....

作物名	適用病害虫名	1箱*当り 使用量	使用時期	使用方法	総使用回数
稲 (箱育苗)	いもち病 紋枯病 ウンカ類 ツマグロヨコバイ コブノメイガ フタオビコヤガ	50g	は種時覆土前 ～移植当日	育苗箱の 上から均 一に散布 する。	本剤 1回 クロラントラニリブロール 1回 トリフルメゾピリム 1回 イソチアニル 3回以内 (移植時までの処理は1回以 内、本田では2回以内) ペンフルフェン 1回
	もみ枯細菌病 白葉枯病 内穎褐変病 穂枯れ (ごま葉枯病菌) 疑似紋枯症 (褐色紋枯病菌) (赤色菌核病菌) イネツトムシ イネドロオウムシ イネミズゾウムシ ニカメイチュウ		移植3日前～ 移植当日		

\* 育苗箱は30×60×3 cm, 使用土壌約5 ℓ