

シクロピリモレート・テフリルトリオン粒剤 バイスコープ1キロ粒剤	取扱メーカー： 北興、三井アグロ 原体メーカー： 全農・三井アグロ、 全農・バイエル・北興
成分： シクロピリモレート〔フェノキシピリダジン系〕…2.0% テフリルトリオン〔トリケトン系〕……………3.0%	性状： 類白色細粒 毒性： 普通物 消防法： －

【品目特性】……………

- 白化剤2成分のみで構成された今までに無いタイプの水稲用中・後期除草剤。
- 白化剤同士の相乗効果により、一年生雑草（ノビエを除く）から多年生雑草まで、ALS阻害剤抵抗性雑草を含む幅広い草種に対して高い枯殺性能を示す。
- 特に、高葉齢のオモダカ、コナギ、ミズアオイ、イボクサ、クサネムに卓効を示す。
- 湛水、ごく浅水のどちらでも散布が可能。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

【使用上のポイント】……………

- 共通注意事項の5、水稲除草剤散布 使用上のポイントを参照。
- ノビエには効果が劣るため、ノビエに有効な移植前後の除草剤との体系で使用する。
- 前処理剤との体系で使用し、雑草の発生状況をよく確認し、時期を失ないように散布する。
- 多年生雑草及びクサネム、イボクサは生育段階によって効果にフレが出るので、必ず適期に散布する。

雑草名	散布適期
オモダカ	矢じり葉5葉期まで
ホタルイ クログワイ	草丈15cm まで
ウリカワ	7葉期まで
ミズガヤツリ	草丈30cm まで
ヘラオモダカ	6葉期まで

【薬効・薬害等の注意】……………

- 共通注意事項の5、水稲除草剤散布 薬効・薬害等の注意を参照。
- 適用作物（水稲）への薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。
- 適用外作物（いぐさ、れんこん、せり、くわい）の薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。
- 共通注意事項の8、適用作物群に関する注意事項を参照。

【安全対策上の注意】……………

- カブレやすい体質の人は取扱いに注意する。
- 皮膚に弱い刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意する。付着した場合は直ちに石けんでよく洗い落とす。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯する。
- 無人航空機散布の際は、共通注意事項の2、空中散布及び無人航空機（無人ヘリコプター等）による散布・滴下に関する注意事項を参照。



【適用と使用法】

作物名	適用雑草名	使用時期	10 a 当り 使用量	使用方法	本剤の 使用回数
移植水稻	一年生雑草（ノビエを除く） オモダカ ホタルイ クログワイ ウリカワ ミズガヤツリ ヘラオモダカ	移植後 14～40日 但し、 収穫45日前まで	1kg	湛水散布， ごく浅く湛水して 散布又は 無人航空機による 散布	1回 ※

※シクロピリモレートを含む農薬の総使用回数：2回以内
 ※テフリトリオンを含む農薬の総使用回数：2回以内