

<b>フルスルファミド粉粒剤</b> <b>ネビリュウ</b>	<b>取扱メーカー：</b> クミカ、三井アグロ  <b>原体メーカー：</b> 三井アグロ
<b>成分：</b> フルスルファミド……………0.30%	<b>性状：</b> 黄色細粒および微粒  <b>毒性：</b> 普通物 <b>消防法：</b> —

### 【品目特性】……………

- 粉立ち、ドリフトが少ない。
- 残効性が長いので土壌混和処理を植付け1～3週間前にしても防除効果がある。
- 土壌中の微生物群に対する影響が極めて少ない。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

### 【使用上のポイント】……………

- 砕土及び土壌混和は丁寧に行う。
- 使用薬量を守り、まき過ぎに注意する。
- 土壌水分が高い場合は使用をさける。
- 土壌混和の深さは10～15cmを目安とする。

### 【薬効・薬害等の注意】……………

- 根こぶ病に感染している苗を本圃に移植すると効果が劣るので、感染していない健全な苗を移植する。

### 【適用と使用法】……………

作物名	適用病害名	10 a 当り 使用量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	フルスルファミドを 含む農薬の総使用回数
キ ャ ベ ツ	根こぶ病	20～30 kg	は種又は 定植前	2回以内	全面土壌混和	2回以内
		20 kg	定植前		作条土壌混和	
は く さ い		20～30 kg	は種又は 定植前	1回	全面土壌混和	1回
		20 kg	定植前		作条土壌混和	
プ ロ ッ コ リ ー		20～30 kg	は種又は 定植前		全面土壌混和	
		20 kg	定植前		作条土壌混和	
カ リ フ ラ ワ ー		20～30 kg	定植前		全面土壌混和	
		20 kg			作条土壌混和	
か ぶ 非結球あぶらな科葉菜類 な ば な 類		30 kg	は種前		全面土壌混和	
		20 kg			作条土壌混和	

- 石灰との併用は効果を安定化させる。
- みずかけな使用する場合、水掛け開始は薬剤処理後2カ月以降を厳守する。
- 適用作物（全般）の薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。
- 適用外作物（にんじん、ほうれんそう、ピーマン、きゅうり）への薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。

### 【安全対策上の注意】……………

- 眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意する。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受ける。

