

<b>エトフェンプロックス・バリダマイシン・フェリムゾン・フサライド粉剤 ブラシントレバリダ粉剤 DL</b>	<b>取扱メーカー：</b> サンケイ*、北興、住友化学 <b>原体メーカー：</b> 三井アグロ、住友化学、住友化学、住友化学
<b>成分：</b> エトフェンプロックス〔ピレスロイド系〕……………0.50% バリダマイシン〔抗生物質〕……………0.30% フェリムゾン〔ピリミジン系 PRTR・1 種〕……………2.0% フサライド〔有機塩素系 PRTR・1 種〕……………1.50%	<b>性状：</b> 類白色粉末45μm 以下， 浮遊性指数20 以下 <b>毒性：</b> 普通物 <b>消防法：</b> ——

### 【適用と使用方法】 .....

作物名	適用病害虫名	10 a 当り 使用量	使用時期 (収穫前)	使用 方法	総使用回数
稲	いもち病 紋枯病 ごま葉枯病 穂枯れ（ごま葉枯病菌） 変色米（アルタナリア菌） 変色米（カーブラリア菌） 疑似紋枯症（赤色菌核病菌） 疑似紋枯症（褐色菌核病菌） 疑似紋枯症（褐色紋枯病菌） ツマグロヨコバイ ウンカ類 イナゴ類	3 ～ 4 kg	14 日前 まで	散布	本剤 2 回以内 エトフェンプロックス 3 回以内 バリダマイシン 6 回以内 （育苗箱灌注は 1 回以内，本田 では 5 回以内） フェリムゾン 2 回以内 フサライド 3 回以内
	カメムシ類	4 kg			