

ピラクロニル・ピラゾレート・ベンゾビスシクロン剤 クサバルカン (1キロ粒剤 / ジャンボ / フロアブル)	取扱メーカー： 三井アグロ 原体メーカー： 協友アグリ、三井アグロ、 エス・ディー・エス
成分： ピラクロニル …2.0% (粒剤), 4.0% (ジャンボ), 3.6% (フロアブル) ピラゾレート〔ピラゾール系 PRTR・第1種〕 …10.0% (粒剤), 20.0% (ジャンボ), 20.0% (フロアブル) ベンゾビスシクロン〔ビスシクロオクタン系〕 …2.0% (粒剤), 4.0% (ジャンボ), 4.0% (フロアブル)	性状： 類白色細粒 (粒剤) 淡褐色粒状, 水溶性バック入り1パック50g (ジャンボ) 類白色水和性粘稠懸濁液体 (フロアブル) 毒性： 普通物 消防法： —

【品目特性】…………… 〈共通〉

- ピラクロニルの配合で効果発現が早い。
 - スルホニルウレア系除草剤抵抗性を獲得した雑草 (ホタルイ、アゼナ、コナギなど) にも効果を示す。
 - 3成分の相互作用で幅広い草種に効果を示す。
 - 畦畔から侵入するアカシキ、イボクサにも有効。
 - 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。
- 〈粒剤・フロアブル〉
- 田植同時処理でも使用可能。
 - 無人ヘリコプターでも散布可能。
- 〈ジャンボ〉
- ジャンボは移植1日後から使用可能。

【使用上のポイント】…………… 〈共通〉

- 共通注意事項の5. 水稻除草剤散布 使用上のポイントを参照。
- 散布後少なくとも3～4日間は通常の湛水状態を保つ。
- 雑草の発生前から発生初期に有効なので、ノビエの2.5葉期までに時期を失ないように散布する。なお、多年生雑草は生育段階によって効果にフレが出るので、必ず適期に散布するように注意する。

雑草名	散布適期		
	粒剤	ジャンボ	フロアブル
ホタルイ ヘラオモダカ ミズガヤツリ	2葉期まで		
ウリカワ	2葉期まで	2葉期まで (移植水稲) 発生始期まで (直播水稲)	2葉期まで
クログワイ	発生前～発生始期まで	発生始期まで	発生前～発生始期まで
オモダカ	発生前～発生始期まで		
ヒルムシロ	発生期まで		
ミズアオイ	1葉期まで		—
アオミドロ・藻類による表層はく離	発生前	—	

〈粒剤〉

- 無人航空機散布の際は、共通注意事項の2. 空中散布及び無人航空機 (無人ヘリコプター等) による散布・滴下に関する注意事項を参照。

〈ジャンボ〉

- 畦畔から小包装のまま10 a 当たり10個の割合で均等に投げ入れる。

〈フロアブル〉

- 使用前に容器をよく振る。
- 水口施用の場合は入水時に本剤を水口に施用し、流入水と共に水田全面に拡散させる。処理後田面水が湛水深3～5 cmに達した時に必ず水を止め、田面水があふれ出ないように注意する。
- 無人航空機滴下の際は、共通注意事項の2. 空中散布及び無人航空機 (無人ヘリコプター等) による散布・滴下に関する注意事項を参照。

【薬効・薬害等の注意】

〈共通〉

- 補植は必ず散布前に行う。
- 適用作物（水稻）の薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。
- 適用外作物（いぐさ、れんこん、せり、くわい）への薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。このような作物の隣接田で使用する場合は十分注意。
- 共通事項の5. 水稻除草剤散布 薬効・薬害等の注意を参照。

- カブレやすい体質の人は取扱いに十分注意する。

〈ジャンボ〉

- 吸湿性があるので湿気には十分注意し、使い残りは外袋の口を強く閉じて保管する。
- 水溶性フィルムが劣化するおそれがあるので下積みにならないようにする。

〈粒剤・フロアブル〉



【安全対策上の注意】

〈共通〉

- 眼に対して刺激性があるので、眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受ける。使用後は洗眼をする。

【適用と使用法】

①クサバルカン 1 キロ粒剤

作物名	適用雑草名	使用時期	10 a 当り 使用量	使用方法	本剤の 使用回数
移植水稻	一年生雑草 マツバイ ホタルイ ヘラオモダカ ミズガヤツリ ウリカワ	移植時	1kg	田植同時散布機 で施用	1回 ※
	クログワイ オモダカ ヒルムシロ アオミドロ・藻類による 表層はく離	移植直後～ ノビエ2.5葉期 但し、 移植後30日まで		湛水散布又は無人 航空機による 散布	
直播水稻	一年生雑草 マツバイ ホタルイ ミズガヤツリ ウリカワ	稲1葉期～ ノビエ2.5葉期 但し、 収穫90日前まで			

※ピラクロニルを含む農薬の総使用回数 : 2回以内

※ピラゾレートを含む農薬の総使用回数 : 2回以内

※ペンゾビシクロンを含む農薬の総使用回数 : 3回以内

②クサバルカンジャンボ

作物名	適用雑草名	使用時期	10 a 当り 使用量	使用方法	本剤の 使用回数
移植水稻	一年生雑草 マツバイ ホタルイ ヘラオモダカ ミズガヤツリ ウリカワ クログワイ オモダカ ヒルムシロ アオミドロ・藻類による 表層はく離	移植後1日～ ノビエ2.5葉期 但し、 移植後30日まで	小包装 (パック) 10個 (500g)	水田に小包装(パック)のまま投げ入れる。	1回 ※
直播水稻	一年生雑草 マツバイ ホタルイ ミズガヤツリ ウリカワ ヒルムシロ	稲1葉期～ ノビエ2.5葉期 但し、 収穫90日前まで			

※ビラクロニルを含む農薬の総使用回数：2回以内

※ビラゾレートを含む農薬の総使用回数：2回以内

※ベンゾピシクロンを含む農薬の総使用回数：3回以内

③クサバルカンフロアブル

作物名	適用雑草名	使用時期	10 a 当り 使用量	使用方法	本剤の 使用回数
移植水稻	一年生雑草 マツバイ ホタルイ ヘラオモダカ ミズガヤツリ ウリカワ クログワイ オモダカ ヒルムシロ	移植時	500 ml	田植同時散布機で施用	1回 ※
		移植直後～ ノビエ2.5葉期 但し、 移植後30日まで		原液湛水散布又は無人航空機による滴下	
直播水稻	一年生雑草 マツバイ ホタルイ ミズガヤツリ ウリカワ ヒルムシロ	稲1葉期～ ノビエ2.5葉期 但し、 収穫90日前まで		原液湛水散布、水口施用又は無人航空機による滴下	

※ビラクロニルを含む農薬の総使用回数：2回以内

※ビラゾレートを含む農薬の総使用回数：2回以内

※ベンゾピシクロンを含む農薬の総使用回数：3回以内