

セトキシジム乳剤 ナブ乳剤	取扱メーカー： 協友アグリ，クミカ，北興， 日本曹達 原体メーカー： 日本曹達
成分： セトキシジム……………20.0% その他 PRTR 該当成分： ポリ(オキシエチレン)＝ノニルフェニルエーテル〔PRTR・1種〕…1.3～3.6% ナフタレン〔PRTR・1種〕……………6.2%	性状： 淡褐色澄明可乳化油状液体 毒性： 普通物 消防法： 第4類・第2石油類（非水溶性）・危険等級III

【品目特性】……………

- イネ科雑草の生長点に作用し，生育期のイネ科雑草を選択的に枯殺するため，広葉作物の生育期に散布できる。
- 土壌中では短時間で分解されるので，後作物への影響がない。
- 雑草に付着した薬剤は，速やかに吸収されるので，散布液が乾けばその後雨が降っても殺草効果に影響がない。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

【使用上のポイント】……………

- 茎葉処理型の除草剤なので，イネ科雑草の発生後に散布する。
- イネ科雑草の1葉期から分けつ中期（第3，第4分けつ期）の間に散布すると優れた殺草効果があり，根まで枯殺する。
- 広葉雑草及びカヤツリグサ科には効果が期待できないので，イネ科雑草優占圃場で使用する。なお，広葉雑草などが混在する場合は，これらの雑草に有効な除草剤との体系で使用する。

●イネ科雑草を完全に枯殺するまでに7～10日を要するので，誤ってまき直しなどしないように注意する。

●てんさいについて，10アール当りの使用液量を25～50ℓで散布する場合，少量散布に適合したノズルを使用する。

●冬期の低温時や出穂期以降など，雑草の生育が停止している時は効果が劣るので，この時期には使用しない。

【薬効・薬害等の注意】……………

- 適用外作物（いね科作物などの有用植物）への薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。

【安全対策上の注意】……………

- 共通注意事項6．街路・公園・堤とう等で使用する場合は注意事項を参照。
- 自動車に散布液がかからないよう注意（塗装汚染）。
- 魚類に影響を及ぼすので，使用時は注意。



【適用と使用法】

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	10 a 当り使用量		本剤の使用回数	使用方法	セトキシジロンを含む農薬の総使用回数					
				薬量	希釈水量								
あずき いんげんめ	—	一年生 イネ科雑草 (スズメノカタビラを除く)	雑草生育期 イネ科雑草3～5葉期 但し、収穫14日前まで	150～ 200 ml	100～ 150 ℓ	2回 以内	雑草茎葉 散布又は 全面散布	2回 以内					
			雑草生育期 イネ科雑草6～8葉期 但し、収穫14日前まで	200 ml									
えんどうめ			雑草生育期 イネ科雑草3～5葉期 但し、収穫30日前まで	150～ 200 ml	100 ℓ	1回		1回					
だいず			雑草生育期 イネ科雑草6～8葉期 但し、収穫30日前まで	200 ml									
			べにばないんげん	雑草生育期 イネ科雑草9～10葉期 但し、収穫30日前まで	250～ 300 ml	100～ 150 ℓ			2回 以内	2回 以内			
らっかせい				雑草生育期 イネ科雑草3～5葉期 但し、収穫60日前まで	150～ 200 ml								
豆類 (未成熟)			雑草生育期 イネ科雑草3～5葉期 但し、収穫90日前まで	200 ml		100 ℓ			1回		1回		
			かんしょ		雑草生育期 イネ科雑草3～5葉期 但し、収穫14日前まで							200 ml	
さといも				雑草生育期 イネ科雑草6～8葉期 但し、収穫30日前まで	150～ 200 ml	100～ 150 ℓ			2回 以内				2回 以内
			ばれいしょ	雑草生育期 イネ科雑草3～5葉期 但し、収穫前日まで								200 ml	
こんにゃく				雑草生育期 イネ科雑草6～8葉期 但し、収穫前日まで	150～ 200 ml	100 ℓ			1回				
			やまのいも	雑草生育期 イネ科雑草3～5葉期 但し、収穫60日前まで								200 ml	
やまのいも (むかご) はくさい				雑草生育期 イネ科雑草6～8葉期 但し、収穫60日前まで	150～ 200 ml	100 ℓ			1回				
			キャベツ	雑草生育期 イネ科雑草3～5葉期 但し、収穫14日前まで								200 ml	

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	10 a 当り使用量		本剤の使用回数	使用方法	セトキシジムを含む農薬の総使用回数
				薬量	希釈水量			
かぶ ブロッコリー カリフラワー 非結球あぶらな科葉菜類	—	一年生 イネ科雑草 (スズメノカタビラを除く)	雑草生育期 イネ科雑草3～5葉期 但し、収穫7日前まで	150～ 200㎖	100～ 150 ℓ	1回		1回
だいこん			雑草生育期 イネ科雑草6～8葉期 但し、収穫14日前まで	200㎖	100 ℓ			
すいか かぼちゃ トマト			雑草生育期 イネ科雑草3～5葉期 但し、収穫14日前まで	150～ 200㎖	100～ 150 ℓ			
			いちご					
にんじん			雑草生育期 イネ科雑草3～5葉期 但し、収穫14日前まで	200㎖				
			雑草生育期 イネ科雑草6～8葉期 但し、収穫14日前まで					
セルリー			雑草生育期 イネ科雑草3～6葉期 但し、収穫28日前まで	150～ 200㎖		2回 以内	雑草茎葉 散布又は 全面散布	2回 以内
ごぼう			雑草生育期 イネ科雑草3～5葉期 但し、収穫30日前まで	200㎖	100 ℓ	1回		1回
			雑草生育期 イネ科雑草6～8葉期 但し、収穫30日前まで					
にんにく			雑草生育期 イネ科雑草3～5葉期 但し、収穫7日前まで	150～ 200㎖	100～ 150 ℓ			
ねぎ			雑草生育期 イネ科雑草3～5葉期 但し、収穫30日前まで		100 ℓ			
たまねぎ			雑草生育期 イネ科雑草3～5葉期 但し、収穫14日前まで	200㎖	100～ 150 ℓ	2回 以内	2回 以内	
			雑草生育期 イネ科雑草6～8葉期 但し、収穫14日前まで					
しょうが もろあざみ ほうれんそう レタス			雑草生育期 イネ科雑草3～5葉期 但し、収穫7日前まで	150㎖		1回	1回	
			雑草生育期 イネ科雑草3～5葉期 但し、収穫前日まで	150～ 200㎖				
アスパラガス にら			雑草生育期 イネ科雑草3～5葉期 但し、収穫前日まで					

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	10 a 当り使用量		本剤の使用回数	使用方法	セトキシジムを含む農薬の総使用回数		
				薬量	希釈水量					
チ コ リ	—	一年生 イネ科雑草 (スズメノカタビラを除く)	根株養成期の雑草生育期 イネ科雑草3～5葉期 但し、根株揃上30日前まで	150～ 200 ml	100～ 150 ℓ	2回 以内	雑草茎葉 散布又は 全面散布	2回 以内		
チ コ リ (根 株)			雑草生育期 イネ科雑草3～5葉期 但し、収穫30日前まで							
てんさい			育苗期の雑草生育期 イネ科雑草1～3葉期 但し、収穫30日前まで	150～ 300 ml (0.3～0.6 ml / ペーパー ポット6冊)	150 ℓ (300 ml / ペ ーパーポッ ト6冊)					
			雑草生育期 イネ科雑草6～8葉期 但し、収穫30日前まで	200 ml	100 ℓ					
		雑草生育期 イネ科雑草3～5葉期 但し、収穫30日前まで	150～ 200 ml	通常散布 50～150 ℓ 少量散布 25～50 ℓ						
レッドトップ シバムギ		イネ科雑草3～5葉期 但し、収穫30日前まで	300～ 400 ml	100～ 150 ℓ						
			150～ 200 ml							
そ ば		一年生 イネ科雑草 (スズメノカタビラを除く)	雑草生育期 イネ科雑草6～8葉期 但し、収穫30日前まで	200 ml	1回	2回 以内		1回		
食用ゆり			雑草生育期 イネ科雑草3～5葉期 但し、収穫30日前まで	150～ 200 ml					100～ 150 ℓ	2回 以内
なたね			雑草生育期 イネ科雑草3～5葉期 但し、収穫60日前まで							
とりかぶと (薬 用)			雑草生育期 イネ科雑草3～5葉期 但し、収穫14日前まで	150～ 200 ml	100 ℓ	2回 以内		2回 以内		
と う き			雑草生育期 イネ科雑草3～6葉期 但し、収穫14日前まで							
は っ か			雑草生育期 イネ科雑草3～5葉期 但し、収穫14日前まで							
みしまさいこ			雑草生育期 イネ科雑草3～6葉期 但し、収穫30日前まで							
お け ら			雑草生育期 イネ科雑草3～5葉期 但し、収穫30日前まで							
しゃくやく (薬用)			雑草生育期 イネ科雑草3～6葉期 但し、収穫60日前まで							
せんきゅう			雑草生育期 イネ科雑草3～6葉期 但し、収穫60日前まで							

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	10 a 当り使用量		本剤の使用回数	使用方法	セトキシジムを含む農薬の総使用回数
				薬量	希釈水量			
ぎぼうし	—	一年生 イネ科雑草 (スズメノカタ ビラを除く)	雑草生育期 イネ科雑草3～5葉期 但し、収穫75日前まで	150～ 200 ml	100～ 150 ℓ	2回 以内	雑草茎葉 散布又は 全面散布	2回 以内
せり		水田一年生 イネ科雑草 (スズメノカタ ビラを除く)	雑草生育期 イネ科雑草3～5葉期 但し、収穫60日前まで				雑草茎葉 散布	
いぐさ		雑草生育期 イネ科雑草3～5葉期			3回 以内	雑草茎葉 散布又は 全面散布	3回 以内	
桑		一年生 イネ科雑草 (スズメノカタ ビラを除く)	雑草生育期 草丈20～30 cm	200～ 250 ml		150～ 200 ℓ		雑草茎葉 散布
たばこ		一年生 イネ科雑草 (スズメノカタ ビラを除く)	雑草生育期 但し、植付10日前まで、 又は植付後10日から 大土寄期まで	150～ 200 ml	100～ 150 ℓ	1回	雑草茎葉 畦面散布	1回
わたきく			雑草生育期 イネ科雑草3～5葉期					
りんどう			雑草生育期 イネ科雑草3～6葉期				雑草茎葉 散布又は 全面散布	
樹木類			雑草生育期 イネ科雑草3～5葉期		100 ℓ			
すぎ (床蓆床)				100～ 150 ℓ				
ひのき (床蓆床)								
樹木等	公園 庭園 堤とう 駐車場 道路 運動場 宅地等		雑草生育期 イネ科雑草3～5葉期	150～ 400 ml	100～ 200 ℓ	3回 以内	植栽地を 除く樹木 等の周辺 地に雑草 茎葉散布	3回 以内
		ススキ チガヤ	雑草生育期 (草丈40 cm)	500～ 1000 ml	150～ 200 ℓ		植栽地を 除く樹木 等の周辺 地に局所 散布	