

フルトラニル水和剤 モンカットフロアブル	取扱メーカー： 日産、日農 原体メーカー： 日農
成分： フルトラニル〔カルボキシアミド系 PRTR・1種〕…20.0%	性状： 類白色水和性粘稠懸濁液体 毒性： 普通物 消防法： —

【品目特性】

- モンカット水和剤の項参照。
- 散布液の調合をしやすいフロアブル製剤として水稲用に開発された。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

【使用上のポイント】

- 本田の水稲に対して希釈倍数300倍で散布する場合は、所定量を均一に散布できる乗用型の速度連動式地上液剤少量散布装置（パンクルスプレーヤなど）を使用する。

【安全対策上の注意】

- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにする。
- 眼に対して弱い刺激性がある。
- 空中散布及び無人ヘリコプター散布の際は、共通注意事項の2、空中散布及び無人航空機（無人ヘリコプター等）による散布・滴下に関する注意事項を参照。
- 魚類に影響を及ぼすので、使用时並びに使用後も注意。

【適用と使用法】

作物名	適用病害名	希釈倍数	10 a 当り 使用液量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用方法	フルトラニルを含む 農薬の総使用回数
稲	紋枯病	1000 ～ 1500 倍	—	14 日 前まで	3 回 以内	散布	3 回以内 (小包装投入 は 1 回以内)
		300 倍	25 ℓ			空中散布	
		原液	120 ml				
		30 倍	3 ℓ				
	8 倍	800 ml	無人ヘリコ プターによ る散布				
	疑似紋枯症 (褐色菌核病菌) 疑似紋枯症 (赤色菌核病菌) 疑似紋枯症 (褐色紋枯病菌)	1000 倍	—			散布	