

<b>ペンタゾン液剤</b> <b>バサグラン液剤（ナトリウム塩）</b>	<b>取扱メーカー：</b> 協友アグリ，クミカ，日農， B A S F*，北興，ホクサン， 住友化学，琉産 <b>原体メーカー：</b> B A S F
<b>成分：</b> ペンタゾンナトリウム塩〔ダイアジン系〕……………40.0%	<b>性状：</b> 赤色澄明水溶性液体 <b>毒性：</b> 普通物 <b>消防法：</b> —

### 【品目特性】……………

- 広範囲の畑地の広葉雑草に除草効果を示す。
- バサグラン粒剤の項参照。
- 雑草の発生揃期から3～4葉期までに処理すれば安定した除草効果を発揮する。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

### 【使用上のポイント】……………

- バサグラン粒剤の項参照。
- 水稲に使用する場合，多年生雑草は生育段階により効果にフレが出るので，必ず適期に散布する。

雑草名	散布適期
ホタルイ ウリカワ ミズガヤツリ ヘラオモダカ	発生盛期～増殖中期
オモダカ	発生盛期～増殖初期
クログワイ	草丈15～30cm
エゾノサヤマカグサ	1～4葉期
シズイ	草丈10～30cm
コウキヤガラ	増殖期
クサネム	本葉展開期

- イネ科雑草には効果がないので，イネ科雑草の優占圃場での使用は控える。
- 広葉雑草とイネ科雑草が混在する圃場では，イネ科雑草に有効な除草剤との体系で使用する。
- 高温など薬害を生じやすい条件での使用は多めの希釈水量を用い，低濃度液をなるべく水稲にかからないように散布する。
- たまねぎの生育散布剤として，生葉4葉期までの散布時期を守る。

### 【薬効・薬害等の注意】……………

- 散布後に曇天，降雨日が長く続くと効果が劣ることがあるので晴天時を見はからって散布する。
- 砂壤土及び漏水のはげしい水田では使用しない（減水深2cm/日以上）。
- 水稲に使用する場合は注意は，バサグラン粒剤の項を参照。
- 適用作物（水稲，たまねぎ，いんげんまめ及び適用作物全般）の薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。
- 適用外作物（周辺作物）への薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。

### 【安全対策上の注意】……………

- 藻類に影響を及ぼすので，使用時並びに使用後も注意。

# 【適用と使用方法】 .....

作物名	適用雑草名	使用時期	10 a 当り使用量		使用方法	適用 地帯	本剤及びベンタゾンを含む農薬の総使用回数		
			薬量	希釈水量					
たまねぎ (春播移植栽培)	一年生雑草 (イネ科を除く)	移植後6月上旬まで (雑草の3～4葉期) 但し収穫30日前まで	60 ～ 120 ml	70 ～ 100 ℓ	雑草茎葉 散布	全域	1 回		
たまねぎ (秋播移植栽培)		移植後生葉4葉期まで (雑草の3～4葉期) 但し収穫30日前まで							
らっきょう		出芽後 (雑草の3～6葉期) 但し収穫60日前まで	100 ～ 200 ml			北海道			
いんげんまめ		初生葉展開期～ 本葉抽出始期 (雑草の2～3葉期)	50 ～ 70 ml						
えんどうまめ		3～6葉期 (雑草の3～6葉期) 但し収穫70日前まで	100 ～ 200 ml			全域		2 回以内	
実えんどう さやえんどう		3～6葉期 (雑草の3～6葉期) 但し収穫40日前まで							
とうもろこし 飼料用とうもろこし		生育期 (雑草の3～6葉期) 但し収穫50日前まで	100 ～ 150 ml						1 回
ソ ル ガ ム		生育期 (雑草の3～6葉期) 但し収穫30日前まで							
麦 類 (小麦を除く)		生育期 (雑草の3～6葉期) 但し収穫90日前まで	100 ～ 200 ml						畦間雑草 茎葉散布
小 麦		生育期 (雑草の3～6葉期) 但し収穫45日前まで							
は と む ぎ		生育期 (雑草の3～6葉期) 但し収穫45日前まで	150 ml			雑草茎葉 散布			
べにばないんげん		生育期 (雑草の生育初期～6葉期) 但し収穫45日前まで	100 ～ 200 ml						
せ り	親株養成期 植付45～60日後まで	200 ml	100 ℓ	雑草茎葉 散布					

作物名	適用雑草名	使用時期	10 a 当り使用量		使用方法	適用 地帯	本剤及びベンタゾンを含む農薬の総使用回数
			薬量	希釈水量			
移 植 水 稲	水田一年生雑草 (イネ科を除く) マツバイ ホタルイ ウリカワ オモダカ ミズガヤツリ ヘラオモダカ クログワイ コウキヤガラ エゾノサヤヌカグサ シズイ クサネム	移植後 15 ～ 55 日 但し収穫 50 日前まで	500 ～ 700 ml	70 ～ 100 ℓ	落水散布 又はごく 浅く湛水 して散布	—	2 回以内
直 播 水 稲	水田一年生雑草 (イネ科を除く) マツバイ ホタルイ ウリカワ オモダカ ミズガヤツリ ヘラオモダカ クログワイ	は種後 35 ～ 50 日 但し収穫 50 日前まで					