

ダイムロン・テニルクロール水和剤 ショッカーフロアブル	取扱メーカー： O A T 原体メーカー：エス・ディー・エス， エス・ディー・エス
成分：ダイムロン〔尿素系〕……………28.0% テニルクロール〔酸アミド系〕……………4.0%	性状：淡褐色水和性粘稠懸濁液体 毒性：普通物 消防法：——

【品目特性】……………

- 水田一年生雑草及びマツバイ，ホタルイ，ヘラオモダカ，ミズガヤツリ等，広範囲の雑草に有効な初期剤である。特にノビエ，ホタルイ等に卓効を示す。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

【使用上のポイント】……………

- 植代直後の散布は，効果を安定させるため土が落ち着いてから散布する。
- 短辺30m程度の水田では畦畔から手振り散布，30mを超える水田では中央部にも散布する。
- 水口施用できる。
- 初期剤なので原則として後処理剤との体系で使用する。
- 共通注意事項の5，水稲除草剤散布 使用上のポイントを参照。

【薬効・薬害等の注意】……………

- 一年生広葉雑草の多発田では使用はさける。
- 移植前に散布する場合は，散布後7日以上の間隔をあけて移植を行う。
- 共通注意事項の5，水稲除草剤散布 薬効・薬害等の注意を参照。
- 適用作物（水稲）への薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。

【安全対策上の注意】……………

- 養魚田での使用はさける。
- 魚類，藻類に影響を及ぼすので，使用时並びに使用後も注意。



【適用と使用法】……………

作物名	適用雑草名	使用時期	10 a 当り 使用量	使用方法	本剤の 使用回数
移植水稲	水田一年生雑草 マツバイ ホタルイ ミズガヤツリ ヘラオモダカ	植代後～移植前7日 又は 移植直後～ノビエ1葉期 但し，移植後30日まで	500 ml	原液湛水散布 又は水口施用	1回 ※

※ダイムロンを含む農薬の総使用回数：3回以内（育苗箱散布は1回以内，本田では2回以内）
 ※テニルクロールを含む農薬の総使用回数：2回以内