

塩素酸塩水溶剤 デゾレート A (水溶剤)	取扱メーカー： 北興 原体メーカー： カーリット
成分： 塩素酸ナトリウム……………60.0%	性状： 類白色水溶性粗粉 106 μ m 以下 毒性： 劇物 消防法： 第1類・塩素酸塩類(第2種)・危険等級II

【品目特性】……………

- 非選択性の接触型除草剤で速効性を持ち、ササ、ススキ、ヨモギなど防除の難しい宿根性雑草やイネ科雑草に極めて効果的である。
- 速効性があり、短期間で雑草防除ができる。
- 畦畔、水稻刈跡、果樹園、桑園、駐車場、運動場、空地などの雑草防除に適している。
- 散布数日後より効果を発揮し、2～3週間で雑草を枯らす。
- 有効成分の特性は、参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

【使用上のポイント】……………

- 本剤の所定量を所要量の水に加え、金属かプラスチックの棒で良く攪拌して溶解し、雑草の茎葉に均一に散布する。
- 使用の際は、展着剤を加用すると効果的である(効果)。
- 使用器具、雑草の成長度等の条件により、使用葉量及び希釈水量は所定の範囲内で増減し使用する(効果)。
- チガヤには1回の散布では効果が劣るので、再生した場合散布する。
- 雑草の種子には効果がないのでなるべく結実前に散布し、再生したら再散布する。
- 散布前後に石灰又は木炭を施用すると本剤の効果が低下することがあるので注意する(効果)。
- 散布直後の降雨は効果を減ずるので、天候を見きわめてから散布する。

【薬効・薬害等の注意】……………

- 稲刈り跡に使用する場合、下記に注意する。
 - 生育期間中のマツバイ及びミズガヤツリに有効なので、マツバイ及びミズガヤツリの枯葉出

現前に処理する。なお、ミズガヤツリを水稻とともに刈り取るところでは、ミズガヤツリの再生後なるべく早く散布する。

○ミズガヤツリ防除に使用する場合、ミズガヤツリの塊茎形成後では効果が劣るので稲刈取り後が塊茎形成前になる地帯でだけ使用する。従って処理後地下茎から発生する地帯では使用をさける。

○排水良好な一毛作田で使用し、散布前に落水し、マツバイ及びミズガヤツリを露出させてから茎葉に均一に散布する。

○連年使用はさける。

●造林予定地、果樹園、桑園、開空地などに使用する場合、下記に注意する。

○散布前には雑草木の葉を刈り込まない。

○果樹園及び下草刈りの場合は、葉や小枝や根元に薬液がかからないように風向きなどに十分注意する。

○桑には養蚕の終わった晩秋に散布する。

○下刈りに使用する場合、植付当年の使用はしない。

●水田畦畔で使用する場合、のり面の散布はさける。流入、飛散等に注意する。

●植栽地を除く樹木等の周辺地で使用する場合、薬剤が樹木等の植栽地に流入、飛散するおそれのある場所等では使用しない。樹木等有用植物の根が分布していると思われるところでは使用をさける。

【安全対策上の注意】……………

●本剤は危険物(第1類塩素酸塩類)に指定されている。油類、燐、硫黄、アンモニア塩類、アンモニア肥料、強酸性物質、木、繊維類のような可燃物との同一保管はさげ、火気には十分に注意し、鍵のかかる冷暗所に貯蔵する。

●散布薬液の飛散によって自動車やカラートタンの塗装等へ影響を与えないよう散布地域の選定に注意し、散布区域内の諸物件に十分留意する。

●薬剤がしみ込んで乾いた衣服や地下足袋などは着火して火傷を起こし易いので、火気には注意する。着火の際は水をかけて消す。作業終了後薬剤の付着した衣服、地下足袋等を良く水で洗っておく。

●家畜が好んで食べるので、保管に注意し、散布直後の散布地域への家畜の放し飼いは行わない。

●成分配合の改良によって従来の製品に比べて難燃性になっており、火災の危険は少ないが、使用器具は木製など可燃性のものはさけ、使用後は水洗いをして良く乾かす。

●周辺の桑葉にはかからないようにする（蚕毒）。

●共通注意事項 6. 街路・公園・堤とう等で使用する場合は注意事項を参照。



【適用と使用法】

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	10 a 当り使用量		本剤の使用回数	使用方法	塩素酸塩を含む農薬の総使用回数
				薬量	希釈水量			
す ぎ ひ の き ま つ からまつ とどまつ えぞまつ	地ごしらえ	一年生雑草 多年生広葉雑草	雑草 生育期	7.5～ 12.5 kg	200～ 300 ℓ	—	雑草茎 葉散布	—
		多年生イネ科雑草		12.5～ 15 kg				
す ぎ ひ の き	下刈り	一年生雑草 多年生広葉雑草		7.5～ 12.5 kg				
		多年生イネ科雑草		12.5～ 15 kg				
開墾後に 栽培する 農作物等	開墾地	一年生雑草 多年生広葉雑草		7.5～ 12.5 kg				
		多年生イネ科雑草		12.5～ 15 kg				
果 樹 類	果樹園	一年生雑草 多年生広葉雑草		7.5～ 12.5 kg				
		多年生イネ科雑草		12.5～ 15 kg				
桑	桑園	一年生雑草 多年生広葉雑草	雑草 生育期 (晩秋期)	7.5～ 12.5 kg	100～ 200 ℓ	—	雑草茎 葉散布	—
		多年生イネ科雑草		12.5～ 15 kg				
水田作物 (水田畦畔)	水田 畦畔			7.5～ 15 kg	100～ 200 ℓ			
樹 木 等	公園、堤とう、 駐車場、道路、 運動場、宅地、 のり面等	一年生雑草 多年生雑草	雑草 生育期	10～ 25 kg	200～ 300 ℓ	3回 以内	植栽地を 除く樹木 等の周辺 地に雑草 茎葉散布	3回 以内
移植水稻 直播水稻	刈取跡	マツバイ	刈取後 10日以内	10～ 13 kg	80～ 100 ℓ	—	雑草茎 葉散布	—
		ミズガヤツリ	刈取後～ ミズガヤ ツリの塊 茎形成前 まで	13 kg				