

ジメテナミドP・ベンディメタリン・リニュロン乳剤 プロールプラス乳剤	取扱メーカー： B A S F 原体メーカー： B A S F, B A S F, T K I
成分： ジメテナミドP〔酸アミド系〕……………6.7% ベンディメタリン〔ジニトロアニリン系 PRTR・1種〕…6.5% リニュロン〔尿素系 PRTR・1種〕……………11.4% その他 PRTR 該当成分： ナフタレン (PRTR・1種) ……………≤3.4% メチルナフタレン (PRTR・1種) ……………≤10.3%	性状： 黄赤色澄明可乳化油状液体 毒性： 普通物 消防法： 第4類・第3石油類 (非水溶性)・危険等級III

【品目特性】……………

- 3種の異なる作用性の成分を混用した土壌処理除草剤で、広範囲の雑草に高い効果を示す。
- 土壌処理で雑草の発生を1～2カ月抑える。
- アレチウリやマルバドクサなどの問題雑草に對し抑草効果を示す。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

【使用上のポイント】……………

- 雑草の生育が進むと効果が劣るので、必ず時期を失しないように散布する。
- 碎土、整地は丁寧に行い、種子が露出しないように覆土はできるだけ丁寧に行い、覆土深を2～3cm以上とする。
- 散布直後の多量の降雨は薬害のおそれがあるので、天候を見きわめてから散布する。

【薬効・薬害等の注意】……………

- 適用作物（だいず、えだまめ）の薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。

【適用と使用法】……………

作物名	適用 雑草名	使用 時期	適用 土壌	10a当り使用量		本剤の 使用回数	使用 方法	適用 地帯	ジメテナミド及びジ メテナミドPを含む 農薬の総使用回数	ベンディメタリ ンを含む農薬の 総使用回数	リニュロンを 含む農薬の 総使用回数
				薬量	希釈水量						
だいず えだまめ	一年生 雑草	は種後 出芽前 (雑草発 生前)	全土壌 (砂土を 除く)	400～ 600ml	70～ 150ℓ	1回	全面 土壌 散布	全域	1回	1回	2回以内 (全面土壌 散布は1回 以内、雑草 茎葉兼土壌 散布は 1回以内)

【安全対策上の注意】……………

- 自動車や壁などの塗装面に散布液がかかると変色するおそれがあるので、散布液がかからないよう注意する。
- 散布の際は農業用マスク、不浸透性手袋、不浸透性防除衣などを着用するとともに保護クリームを使用する。作業後は直ちに身体を洗い流し、うがいをするとともに衣服を交換する。
- 夏期高温時の使用をさける。(カブレ)
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにする。

