

スミトップ M 粉剤

成分：MEP〔有機リン系 PRTR・1種〕……3.0%

チオファネートメチル〔ベンズイミダゾール系 PRTR・1種〕……2.0%

毒性：普通物

【適用と使用方法】

作物名	適用病害虫名	10 a 当り 使用量	使用時期 (収穫前)	使用 方法	総使用回数
だいず	紫斑病 マメシンクイガ カメムシ類 ダイズサヤタマバエ シロイチモジマダラメイガ	3～4 kg	開花期～ 若莢期 但し 21日前まで	散布	本剤 4回以内 ME P 4回以内 チオファネートメチル 4回以内 (種子への処理は1回以内)
小 麦	赤かび病 うどんこ病 アブラムシ類 ヒメトビウンカ ムギアカタマバエ	4 kg	14日前 まで		本剤 1回 ME P 1回 チオファネートメチル 4回以内 (種子への処理は1回以内、散 布及び無人ヘリ散布は合計3回 以内、出穂期以降は2回以内)
麦 類 (小麦を 除く)					本剤 1回 ME P 1回 チオファネートメチル 3回以内 (種子への処理は1回以内、出 穂期以降は1回以内)
つつじ類	褐斑病 ツツジグンバイ		—		本剤 5回以内 ME P 6回以内 チオファネートメチル 5回以内

〔取扱メーカー〕 日本曹達