トルクロホスメチル・ヒドロキシイソキサゾール粉剤 リゾレックス H 粉剤	<b>取扱メーカー</b> : ホクサン <b>原体メーカー</b> : 住友化学, 三井アグロ
成分:トルクロホスメチル [有機リン系]5.0% ヒドロキシイソキサゾール4.0%	性状:類白色粉末45 µ m 以下 毒性:普通物 消防法:——

## 

- ●リゾクトニア菌、ピシウム菌、アファノマイセス菌によるてんさいの苗立枯病に高い効果がある。
- ●病原菌糸体に対し強い殺菌作用を発揮する。
- ●土壌吸着が強く流亡しにくいため、土壌混和処理では通常30~45日間の残効がある。
- ●有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一 覧表」を参照。

## 【使用上のポイント】…………

●なるべくは種直前に土壌混和を行う。

## 

●眼に対して弱い刺激性があるので眼に入らない よう注意する。眼に入った場合は直ちに水洗する。



## 【適用と使用法】…………

作物名	適用 病害名	使用量	使用 時期	本剤の 使用回数	使用方法	トルクロホスメチルを 含む農薬の総使用回数	ヒドロキシイソキサゾール を含む農薬の総使用回数
てんさい	苗立枯病	150~250 g /10 a分の 用土約280 ℓ 100~150 g /10 a分の 覆土約20 ℓ 50~100 g /10 a分の 突起板使用 覆土約 7 ℓ	は種前	1回	ペーパー ポット用の 用土又は 覆土に均一 に混和	6回以内 (育苗上壌への 混和は1回以 内,500倍希 釈灌注は1回 以内,100倍 希釈灌注は1 回以内,散布 は3回以内)	5回以内 (種子粉衣は1 回以内,育苗土 壌への混和は1 回以内,灌注は 3回以内)