

DMTP水和剤 スプラサイド水和剤	取扱メーカー： クミカ 原体メーカー： 全農
成分： DMTP〔有機リン系 PRTR・1種〕……………36.0% その他 PRTR 該当成分： ポリ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル〔PRTR・1種〕…2.0%	性状： 類白色水和性粉末45μm以下 毒性： 劇物 消防法： —

【品目特性】……………

- 温度による効果の変動が比較的少なく、チョウ目害虫を始め、カイガラムシ、コナジラミ、アザミウマ、カメムシと幅広い殺虫スペクトラムを持っている。
- 防除効力の持続期間が長い。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

【使用上のポイント】…………… <りんご>

- シンクイムシの防除は産卵期から被害初期に産卵・食入防止をねらって、7～10日間隔で散布をする。

<なし>

- シンクイムシ類防除はりんごに準じる。
- カメムシ類に対しては、発生に応じてくり返し散布する。また園外からの成虫の飛来が多いので、広域一斉防除及び周辺の草木への散布が望ましい。

<もも>

- シンクイムシ類防除はりんごに準じる。
- クワコナカイガラムシには幼虫のふ化期をねらって散布する。

<ピーマン、なす>

- ミナミキロアザミウマに対しては初発生を見たら直ちに散布する（生息密度が高まると効果が劣る）。また、卵、さなぎには約1週間間隔で2～3回くり返し散布する。
- かけ残しのないよう丁寧に散布する。

【薬効・薬害等の注意】……………

- 長期間高温下に放置すると固まるおそれがあるので、密封してカギのかかる乾燥した冷暗所に保管する。
- ブドウネアブラムシに使用する場合には病害虫防除所など関係機関の指導を受けることが望ましい。
- 石灰硫黄合剤、ボルドー液などアルカリ性薬剤との混用はさける。
- 適用作物（もも、なし、花き類、メロン）の薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。
- 適用外作物（花木、くろまつ、五葉松、かえで類、つた）への薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。
- 共通注意事項8. 適用作物群に関する注意事項を参照。

【安全対策上の注意】……………

- 施設内で散布する場合には、野外で散布する場合の注意事項を厳守すると共に、窓を開放するなど換気に十分注意し、散布液が室内にこもらないようにする。
- 甲殻類に影響を及ぼすおそれがあるので、使用時は注意。
- 散布器具・容器の洗浄水及び空容器は適切に処理する。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにする。
- 共通注意事項7. ミツバチに対する注意事項を参照。



【適用と使用法】

作物名	適用害虫名	希釈倍数	10 a 当り 使用液量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用方法	DMTPを含む 農薬の総使用回数	
かんきつ (みかんを除く)	カイガラムシ類 (ヤノネカイガラムシを除く)	1500 倍	200～ 700 ℓ	90日前まで	4 回以内	散布	4 回以内	
みかん	ヤノネカイガラムシ (幼虫～未成熟成虫) カメムシ類			14日前まで			4 回以内 (50～100倍希釈 散布は2回以内)	
りんご	シンクイムシ類 カイガラムシ類	1500～ 2000 倍		30日前まで	2 回以内		2 回以内	
	アブラムシ類 ハマキムシ類 (コカクモンハマキを除く) ギンモンハモグリガ カメムシ類 リンゴワタムシ	1500 倍						
なし (有袋栽培)	シンクイムシ類 アブラムシ類 カイガラムシ類	1500～ 2000 倍		7 日前まで	3 回以内		3 回以内	
	ナシホソガ カメムシ類 ナシチビガ	1500 倍						
なし (無袋栽培)	シンクイムシ類 アブラムシ類 カイガラムシ類	1500～ 2000 倍		21 日前まで	2 回以内		2 回以内	
	ナシホソガ カメムシ類 ナシチビガ	1500 倍						
もも	シンクイムシ類 カイガラムシ類 モモハモグリガ	1500～ 2000 倍		14 日前まで			4 回以内 (200倍希釈散 布は2回以内、 1500～2000 倍 希釈散布は2回 以内)	
	クビアカツヤカミキリ	1500 倍						3 回以内 (収穫後～ 発芽前は1回 以内、発芽後 は2回以内)
ネクタリン	シンクイムシ類 カイガラムシ類 モモハモグリガ	1500～ 2000 倍		10 ℓ / m ²	90 日前まで		土壌灌注	2 回以内 (休眠期は 1 回以内)
ぶどう	カイガラムシ類 チャノキイロアザミウマ	1500 倍						
	ブドウネアブラムシ	500 倍						
かき	カイガラムシ類 カキクダアザミウマ カキノヒメヨコバイ カメムシ類	1500 倍	200～ 700 ℓ	30 日前まで	3 回以内	散布	3 回以内	
	チャノキイロアザミウマ	1000 倍		7 日前まで				
	おうとう	カイガラムシ類 カメムシ類 ショウジョウバエ類						1500 倍
キウイフルーツ		クワシロカイガラムシ						

作物名	適用害虫名	希釈倍数	10 a 当り 使用液量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用方法	DMTPを含む 農薬の総使用回数
う め	カイガラムシ類 クビアカツヤカミキリ	1500 倍	200～ 700 ℓ	14日前まで	2 回以内	散布	2 回以内
す も も	シンクイムシ類 クビアカツヤカミキリ						
く る み	ケムシ類	1000 倍		7日前まで			
な つ め	カイガラムシ類	2000 倍		14日前まで			
す い か メ ロ ン	ミナミキイロアザミウマ	1000 倍	100～ 300 ℓ	7日前まで	5 回以内		5 回以内
				3日前まで	2 回以内		2 回以内
な す	オンシツコナジラミ ミナミキイロアザミウマ			14日前まで	3 回以内		3 回以内
ピーマン	ミナミキイロアザミウマ						
花き類・ 観葉植物	オンシツコナジラミ			発生初期	6 回以内	6 回以内	

作物名	適用場所	適用害虫名	10 a 当り使用量		使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用 方法	DMTPを含む 農薬の総使用回数
			薬量	使用液量				
ぶどう	温室, ガラス 室, ビニール ハウス等密閉 できる場所	カイガラムシ類	200 g	9 ℓ	14日前まで	2 回以内	常温 煙霧	2 回以内 (休眠期は 1 回以内)