

<b>バリダマイシン・フェリムゾン・フサライド水和剤 ブラシンバリダゾル</b>	<b>取扱メーカー：</b> サンケイ＊、北興、住友化学  <b>原体メーカー：</b> 住友化学、住友化学、住友化学
<b>成分：</b> バリダマイシン〔抗生物質〕……………5.0% フェリムゾン〔ピリミジン系 PRTR・1種〕…………20.0% フサライド〔有機塩素系 PRTR・1種〕…………15.0%	<b>性状：</b> 類白色水和性粘稠懸濁液体 <b>毒性：</b> 普通物 <b>消防法：</b> ——

### 【品目特性】……………

- 空中散布専用剤（有人・無人ヘリコプター散布）で広域防除に適している。
- ブラシン粉剤DL、ラプサイド粉剤DL、バリダシン液剤5の項参照。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

### 【使用上のポイント】……………

- いもち病と紋枯病の防除時期が重なる時期に均一に散布する。
- 穂いもちと紋枯病の同時防除は穂ばらみ期から穂揃期にかけて1～2回散布が効果的である。
- 使用に際しては、容器をよく振ってから薬剤の所定量を取り出し、水に加えて、十分に攪拌する（長時間放置すると沈澱を生じることがあるが、振れば元の状態に戻る）。

### 【薬効・薬害等の注意】……………

- 適用外作物（たばこ、けいとう、だいず、あずき、きく、いんげんまめ）への薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。

### 【安全対策上の注意】……………

- 空中散布及び無人ヘリコプター散布の際は、共通注意事項の2. 空中散布及び無人航空機（無人ヘリコプター等）による散布・滴下に関する注意事項を参照。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯する。



### 【適用と使用法】……………

作物名	適用病害名	希釈 倍数	10 a 当り 使用液量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用 方法	バリダマイシンを含む 農薬の総使用回数	フェリムゾンを含む 農薬の総使用回数	フサライドを含む 農薬の総使用回数
稲	いもち病 紋枯病	30 倍	3 ℓ	14 日前 まで	2 回以内	空中散布	6 回以内 (育苗箱灌注は 1 回以内、本田 では 5 回以内)	2 回以内	3 回以内
		8 倍	800 ml			無人ヘリ コプター による散 布			