

クロルピリホス水和剤 ダースバンD F	取扱メーカー： クミカ、日産、ダウ 原体メーカー： ダウ
成分： クロルピリホス〔有機リン系 PRTR・1種〕………75.0%	性状： 淡黄色水和性細粒及び微粒 毒性： 劇物 消防法： ——

【品目特性】 ……………

- 薬剤調製時の粉立ちが少ない。
- 有機溶剤を含まず、においが少ない。
- 希釈倍率が高く、調製し易い。
- ハマキムシ類、シンクイムシ類、カイガラムシ類に高い効果がある。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

【薬効・薬害等の注意】 ……………

- ボルドー液との混用は使用直前に行う。

【安全対策上の注意】 ……………

- 甲殻類に強い影響を及ぼすので特に注意。
- 散布器具・容器の洗浄水及び空容器は適切に処理する。
- 共通注意事項6、街路・公園・堤とう等で使用する場合の注意事項を参照。
- 共通注意事項7、ミツバチに対する注意事項を参照。



【適用と使用法】 ……………

作物名	適用害虫名	希釈倍数	10 a 当り 使用用量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用 方法	クロルピリホスを含 む農薬の総使用回数
りんご	シンクイムシ類 ハマキムシ類 クワコナカイガラムシ リンゴワタムシ ケムシ類	3000 倍	200～ 700 ℓ	45 日前 まで	1 回	散布	1 回
なし	シンクイムシ類 ハマキムシ類 クワコナカイガラムシ	3000～ 4000 倍		30 日前 まで	3 回以内		3 回以内
もも	ウメシロカイガラムシ シンクイムシ類	3000 倍		14 日前 まで	5 回以内		5 回以内
ネクタリン	ハマキムシ類				2 回以内		2 回以内
すもも	シンクイムシ類 ウメシロカイガラムシ						
みかん (施設栽培)	ミカンキイロアザミウマ			2000 倍	30 日前 まで		1 回
みかん (露地栽培)	クワゴマダラヒトリ カイガラムシ類						
かんきつ (みかんを除く)	ミカンキイロアザミウマ	2000～ 3000 倍		60 日前 まで	2 回以内		2 回以内
ブルーベリー	カイガラムシ類	3000 倍		14 日前 まで			
かりん	ナシヒメシンクイ			100～ 300 ℓ			
りんどう	リンドウホソハマキ						