

|  |  |
|--|--|
| <b>IPC乳剤</b><br><b>クロロ IPC</b>   | <b>取扱メーカー：</b><br>石原、日産、日農、ホクサン<br><br><b>原体メーカー：</b><br>保土谷                         |
| <b>成分：</b> IPC〔カーバメート系〕……………45.8%<br><b>その他 PRTR 該当成分：</b><br>ナフタレン〔PRTR・1種〕……………3.6%〈2.0～6.0%〉<br>1,2,4-トリメチルベンゼン〔PRTR・1種〕…1.7%〈0.4～4.0%〉 | <b>性状：</b> 黄褐色透明可乳化油状液体<br><br><b>毒性：</b> 普通物<br><b>消防法：</b> 第4類・第2石油類（非水溶性）・危険等級III |

### 【品目特性】……………

- 非ホルモン型移行性の除草剤で、雑草の根元及び幼芽部から吸収され、細胞分裂や呼吸を阻害して雑草を枯死させる。
- 冬の畑地に発生するスズメノテッポウ、スズメノカタビラ等の冬生イネ科雑草、ハコベ、ノミノフスマ、タネツケバナ、ミチヤナギ、タデ類には優れた効果がある。
- 雑草の発芽前から発生始期までの土壌処理で高い効果を示す。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

### 【使用上のポイント】……………

- 秋から春にかけての、気温が20℃以下の時期に使用する。
- 成長した雑草に対しては、ほとんど効果が認められないので、は種又は植付直後か中耕施肥直後などの雑草発芽前後、又は稚幼期に土壌に均一に散布する。
- 土壌が乾燥していると効果が劣るので、適湿な時を選んで散布する。
- は種後使用の場合は、必ず厚さ2～3cm覆土後に散布する。

### 【薬効・薬害等の注意】……………

- 砂質土壌では、使用をさける。
- 堆肥のみで覆土した場合は、使用をさける。
- 散布後は中耕、培土、土入れなどにより土壌表層を動かすと薬剤処理層がこわれ、薬効を落とすので十分注意する。
- 麦に使用する場合、催芽まきの場合は使用しない。晩播で越冬までに5葉に達する見込みのない場合は散布しない。
- にんじんに使用する場合（10a当り300ml）、アカザ・キク科の優占する圃場では効果が劣るので、有効な薬剤と組み合わせで防除する。
- レタスでは、特に処理時の温度に影響されるので、適用地帯は東日本並びに山間高冷地とする。
- ごぼうでは、べたかけ及びマルチ栽培では薬害が生じる場合があるので使用しない。
- 適用作物（全般及びごぼう）の薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。
- 適用外作物（広葉作物）への薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。

### 【安全対策上の注意】……………

- 自動車などにかからないように注意する（塗装汚染）。
- 保管時には、火気をさけ、種子、苗、肥料又は他の農薬などと隔離する。

【適用と使用法】 .....

| 作物名                             | 適用雑草名                     | 使用時期                             | 10 a 当り使用量     |              | 使用<br>方法       | 本剤及びPCを含む<br>農薬の総使用回数 |
|---------------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------|--------------|----------------|-----------------------|
|                                 |                           |                                  | 薬量             | 希釈水量         |                |                       |
| 麦 類                             | 一年生雑草                     | は種直後又は<br>2～3葉期                  | 100～<br>150 ml | 70～<br>100 ℓ | 全面<br>土壌<br>散布 | 1 回                   |
| た ま ね ぎ                         |                           | 定植活着後<br>又は中耕後<br>但し<br>収穫30日前まで | 200～<br>300 ml |              |                | 2 回以内                 |
| て ん さ い                         |                           | は種直後                             | 100～200 ml     |              |                |                       |
| ほうれんそう                          |                           |                                  |                |              |                |                       |
| い ち ご                           |                           | 定植活着後<br>但し<br>定植7日後まで           | 150～<br>200 ml |              | 株間<br>土壌<br>散布 | 1 回                   |
| いんげんまめ                          |                           | は種直後                             | 500～900 ml     |              | 全面<br>土壌<br>散布 |                       |
| に ん じ ん                         |                           | は種後5～15日<br>(発芽前)                | 500～<br>600 ml |              |                |                       |
| ご ぼ う                           |                           | は種直後                             | 300～600 ml     |              |                |                       |
|                                 |                           |                                  | 200～500 ml     |              |                |                       |
| キ ャ ベ ツ                         |                           | 定植後 但し<br>収穫60日前まで               | 150～300 ml     |              | 株間<br>土壌<br>散布 |                       |
| だ い ず                           |                           | は種後発芽前                           | 200～300 ml     |              | 全面<br>土壌<br>散布 |                       |
| あ ず き                           |                           | は種直後                             |                |              |                |                       |
| レ タ ス<br>非結球レタス                 |                           | 定植活着後<br>但し<br>収穫60日前まで          | 300～500 ml     |              | 株間<br>土壌<br>散布 |                       |
| アスパラガス<br>(苗床)                  |                           | は種直後                             | 200～300 ml     |              | 全面<br>土壌<br>散布 |                       |
| アスパラガス<br>(定植畑)                 |                           | 培土後雑草発生前<br>但し<br>収穫30日前まで       | 250～300 ml     |              |                |                       |
| そらまめ※                           |                           | 中耕培土後<br>但し<br>収穫90日前まで          | 200 ml         |              |                |                       |
| 未成熟そらまめ※                        |                           | 中耕培土後<br>但し<br>収穫60日前まで          | 200 ml         |              |                |                       |
| チューリップ                          | 植付後                       | 300 ml                           | 株間<br>土壌<br>散布 |              |                |                       |
| 日 本 芝<br>(こうらいしば)<br>(ひめこうらいしば) | 雑草発生前～<br>発生始期<br>(秋期～春期) | 400～600 ml                       | 200～<br>300 ℓ  | 全面<br>散布     | 2 回以内          |                       |

※：同一薬剤名（会社名を除き）であっても登録内容が異なる箇所。使用時には必ずラベルで登録内容を確認すること。