

オキサジクロメホン・ピラクロニル・ピラゾスルフロンエチル・ベンゾビシクロン剤 シリウスエグザ (1キロ粒剤 / ジャンボ / フロアブル)	取扱メーカー： 日産 原体メーカー： 全農、協友アグリ、日産、 エス・ディー・エス
成分： オキサジクロメホン〔オキサジノン系 PRTR・1種〕 ……0.40% (粒剤), 1.4% (ジャンボ), 0.80% (フロアブル) ピラクロニル ……2.0% (粒剤), 6.6% (ジャンボ), 4.0% (フロアブル) ピラゾスルフロンエチル〔スルホニルウレア系〕 ……0.30% (粒剤), 1.0% (ジャンボ), 0.60% (フロアブル) ベンゾビシクロン〔ビシクロオクタン系〕 ……2.0% (粒剤), 6.7% (ジャンボ), 4.0% (フロアブル)	性状： 淡灰色細粒 (粒剤) 淡褐色細粒, 水溶性パック入り 1パック30g (ジャンボ) 類白色水和性粘稠懸濁液体 (フロアブル) 毒性： 普通物 消防法： —

【品目特性】

〈共通〉

- 4種の有効成分を混合。速効的な成分と、残効に優れる成分を組み合わせたことにより、発生タイミングの異なる様々な草種に対応できる。
- ヒエ、広葉雑草共に50日程度の残効があり、早めの散布でも十分な効果が期待できる。
- 発生が遅い多年生雑草には初期剤との体系処理で更なる除草効果が期待できる。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

〈粒剤・フロアブル〉

- 田植同時散布にも適している。

【使用上のポイント】

〈共通〉

- 共通注意事項の5. 水稻除草剤散布 使用上のポイントを参照。
- 本剤は雑草の発生前から生育初期に有効なので、ノビエ2.5葉期までに時期を失ないように散布する。
- 多年生雑草は生育段階によって効果にフレがあるので、必ず適期に散布するように注意する。

雑草名	散布適期		
	粒剤	ジャンボ	フロアブル
ホタルイ ミズガヤツリ ヘラオモダカ	2葉期まで		
ウリカワ	2葉期まで		発生始期
ヒルムシロ	発生期まで		
セリ	再生始期まで		
オモダカ クログワイ	発生始期まで		—
シズイ	草丈3cm まで	—	
アオミドロ・藻類 による表層はく離	発生前	発生始期 まで	—

〈粒剤・ジャンボ〉

- オモダカ、クログワイ、シズイに対しては、必要に応じて有効な後処理剤との組み合わせで使用。

〈粒剤〉

- 雑草害をもたらす栽培目的以外のイネの防除に使用する場合は、発生前処理が有効なので、散布適期を失しないよう散布する。また、必要に応じて有効な後処理剤との組み合わせで使用。

【薬効・薬害等の注意】

〈共通〉

- 共通注意事項の5. 水稻除草剤散布 薬効・薬害等の注意を参照。
 - 適用作物 (水稻) の薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。
 - 適用外作物 (いぐさ、れんこん、せり、くわい) への薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。
- 〈粒剤〉
- 直播水稻に使用する場合は、薬害をさけるため

稲の1葉期以降に使用し、稲の根が露出している時の使用はさける。

〈ジャンボ〉

●本剤は小包装（パック）のまま10a当り10個の割合で水田に均等に投げ入れる。

●散布時は圃場の水深を5cm以上にして実施する。

〈フロアブル〉

●蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにする。

〈粒剤〉



【安全対策上の注意】

〈共通〉

●藻類に影響を及ぼすので、使用時並びに使用後も注意。

●散布器具・容器の洗浄水及び空容器は適切に処理する。

【適用と使用方法】

①シリウスエグザ1キロ粒剤

作物名	適用雑草名	使用時期	10 a 当り 使用量	使用方法	本剤の 使用回数
移植水稲	一年生雑草 マツバイ ホタルイ ウリカワ ミズガヤツリ ヘラオモダカ ヒルムシロ	移植時	1kg	田植同時 散布機で施用	1 回 ※
	セリ オモダカ クログワイ シズイ アオミドロ・藻類による 表層はく離	移植直後～ ノビエ2.5葉期 但し, 移植後30日まで			
直播水稲	一年生雑草 マツバイ ホタルイ ウリカワ ミズガヤツリ ヒルムシロ セリ	稲 1 葉期～ ノビエ2.5葉期 但し, 収穫90日前まで		湛水散布	

※オキサジクロメホンを含む農薬の総使用回数 : 2回以内

※ピラクロニルを含む農薬の総使用回数 : 2回以内

※ピラゾスルフロンエチルを含む農薬の総使用回数 : 1回

※ベンゾピシクロンを含む農薬の総使用回数 : 3回以内

②シリウスエグザジャンボ

作物名	適用雑草名	使用時期	10 a 当り 使用量	使用方法	本剤の 使用回数
移植水稻	一年生雑草 マツバイ ホタルイ ウリカワ ミズガヤツリ ヘラオモダカ ヒルムシロ セリ オモダカ クログワイ アオミドロ・藻類による 表層はく離	移植直後～ ノビエ2.5葉期 但し、移植後30日まで	小包装 (パック) 10個(300g)	水田に小包装 (パック) の まま投げ入れ る。	1回 ※

※オキサジクロメホンを含む農薬の総使用回数 : 2回以内
 ※ピラクロニルを含む農薬の総使用回数 : 2回以内
 ※ピラゾスルフロンエチルを含む農薬の総使用回数 : 1回
 ※ベンゾビシクロンを含む農薬の総使用回数 : 3回以内

③シリウスエグザフロアブル

作物名	適用雑草名	使用時期	10 a 当り 使用量	使用方法	本剤の 使用回数
移植水稻	一年生雑草 マツバイ ホタルイ ウリカワ ミズガヤツリ ヘラオモダカ ヒルムシロ セリ	移植時	500 ml	田植同時 散布機で施用	1回 ※
		移植直後～ ノビエ2.5葉期 但し、移植後30日まで		原液湛水散布	

※オキサジクロメホンを含む農薬の総使用回数 : 2回以内
 ※ピラクロニルを含む農薬の総使用回数 : 2回以内
 ※ピラゾスルフロンエチルを含む農薬の総使用回数 : 1回
 ※ベンゾビシクロンを含む農薬の総使用回数 : 3回以内