

ホスチアゼート粒剤 ネマトリンエース粒剤	取扱メーカー： 石原、ホクサン、一農 原体メーカー： 石原産業
成分： ホスチアゼート〔有機リン系 PRTR・1種〕……………1.5%	性状： 類白色細粒 毒性： 普通物 消防法： ——

【品目特性】……………

- くん蒸剤のように被覆期間やガス抜き作業の必要がなく、処理直後よりは種、定植ができる。
- 直接センチュウと接触することにより低濃度でも運動を阻害し、かつ殺センチュウ力を有することから、安定した高い効果がある。
- 浸透移行性を有するため、センチュウの根部への侵入の阻害、根内のセンチュウの発育抑制などの効果を示す。さらに、アブラムシ類、ハダニ類、アザミウマ、コナジラミなどの地上部害虫にも副次的効果がある。
- 土壌 pH、土性、地温などの土壌条件の変動による効果差が少なく、安定した高い効果がある。
- 普通物であり、また有効成分の蒸気圧が低く揮散のおそれがない。ガス化しないため、周辺環境にも悪影響がほとんどない。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

【使用上のポイント】……………

- ごぼう、らっきょう、いちじく、かんしょ以外の作物に使用する場合は、圃場全面に均一に散布し、土壌中に均等に分布するよう丁寧に混和する。
- 散布が不均一だったり、混和が不十分の場合、効果不足や薬害を生じることがあるので注意する。
- いちじくに使用する場合、樹冠下全面に処理するが、栽培様式からみて可能であれば、土壌混和をする。
- 作物によっては定植時展開葉に軽微な薬害を生じることがあるが、その後の展開葉及び生育には特に影響はない。

【薬効・薬害等の注意】……………

- 適用作物（いちじくを除く）の薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。
- 共通注意事項 8. 適用作物群に関する注意事項を参照。

【安全対策上の注意】……………

- つまみ菜、間引き菜には使用しない。
- いちごの高設栽培では使用しない。
- 共通注意事項 7. ミツバチに対する注意事項を参照。



【適用と使用法】

作物名	適用害虫名	10 a 当り 使用量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用方法	ホスチアゼートを含 む農業の総使用回数	
い　ち　じ　く	ネコブセンチュウ	20kg	収穫60日 前まで	1回	樹冠下 処理	1回	
か　ん　し　ょ		15～ 20kg	植付前		作条土壌 混和	2回以内 (苗床は1回 以内、本圃は 1回以内)	
		10～ 30kg	苗床植付前		全面土壌 混和	2回以内 (定植前の土壌 混和は1回以 内、土壌灌注 は1回以内)	
ばれいしょ	アブラムシ類 ネコブセンチュウ	20～ 25kg	植付前				
	ジャガイモシストセンチュウ ジャガイモシロシストセンチュウ	20kg					
やまのいも やまのいも(むかご)	ネコブセンチュウ						25kg
さ　と　い　も	ネグサレセンチュウ						
ブロッコリー カリフラワー	テンサイシストセンチュウ	20kg					定植14日 前まで
オ　ク　ラ	ネコブセンチュウ						は種前
と　う　が　ん し　ろ　う　り			定植前 但し、 収穫45日 前まで				
			ズッキーニ(花)				定植前 但し、 収穫21日 前まで
ズ　ッ　キ　ー　ニ か　ぼ　ち　や			定植前				
き　ゅ　う　り に　が　う　り			15～ 20kg				は種前又は 定植前
す　い　か メ　ロ　ン ト　マ　ト ミニトマト		定植前					
な　　　　す	ハダニ類 ミナミキイロアザミウマ オンシツコナジラミ		20kg				
ピ　ー　マ　ン	ネコブセンチュウ		15～ 20kg		は種前		
い　　ち　　ご	ハダニ類		25kg				
	ネグサレセンチュウ		20～ 25kg				
だ　い　こ　ん			ネコブセンチュウ			15～ 20kg	
	に　ん　じ　ん	ネグサレセンチュウ	20kg				
ネコブセンチュウ		15～ 20kg					

作物名	適用害虫名	10 a 当り 使用量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用方法	ホスチアゼートを含む 農薬の総使用回数
ご ぼ う	ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ	20kg	は種前	1 回	は種溝土 壤混和	1 回
ら つ き よ う	ネダニ ネグサレセンチュウ	15kg	植付前		植溝土壤 混和	
に ん に く	イモグサレセンチュウ	25kg			3回以内 (植付前の土 壤混和は1回 以内，球根浸 漬は1回以内， 土壌灌注は1 回以内)	
し ょ う が	ネコブセンチュウ	20kg			定植前	2回以内 (植付前の土 壤混和は1回以 内，土壌灌注 は1回以内)
葉し ょ う が			1 回			
みょうが(花穂) みょうが(茎葉)			2回以内 (種根茎浸漬は 1回以内，定 植前の土壌混 和は1回以内)			
あ ず き			ダイズシストセンチュウ		は種前	1 回
ガ ー ベ ラ	ネコブセンチュウ	植付前				
カーネーション	クローバーシストセンチュウ		25kg		1 回	
す ず ら ん	ネグサレセンチュウ	20～ 25kg				定植前
き く	ナミハダニ	20kg	定植前		全面土 壤混和	
ぼ た ん	ネコブセンチュウ					3回以内 (定植前の土 壤混和は1回 以内，生育期 の根鉢浸漬は 1回以内，土 壌灌注は1回 以内)
つ つ じ 類	イシユクセンチュウ					1 回