

<b>カルタップ・BPMC・プロベナゾール粒剤</b> <b>パダンバッサオリゼメート粒剤</b>	<b>取扱メーカー：</b> 協友アグリ, サンケイ*, 住友化学, Meiji <b>原体メーカー：</b> 住友化学, 住友化学, Meiji
<b>成分：</b> カルタップ塩酸塩〔ネライストキシン系 PRTR・1種〕…4.0% BPMC〔カーバメート系 PRTR・1種〕……………4.0% プロベナゾール……………8.0%	<b>性状：</b> 類白色細粒 <b>毒性：</b> 劇物 <b>消防法：</b> —

**【適用と使用方法】** ……………

作物名	適用病害虫名	10 a 当り 使用量	使用時期 (収穫前)	使用方法	総使用回数
稲	いもち病 白葉枯病 もみ枯細菌病 ニカメイチュウ コブノメイガ イネツトムシ ウンカ類 イネドロオイムシ ツマグロヨコバイ	3～4 kg	30 日前 まで	散布	本剤 2 回以内 カルタップ 6 回以内 (浸種前は1回以内, 浸 種後から直播では種時 又は移植時までの処理は 1回以内) B P M C 5 回以内 プロベナゾール 2 回以内 (移植時までの処理は 1 回以内)
	イネミズゾウムシ	4 kg			