

クミルロン・ペントキサゾン水和剤 草笛フロアブル	取扱メーカー： 協友アグリ，日産 原体メーカー： 丸紅アグロ，科研製薬
成分： クミルロン〔尿素系 PRTR・1 種〕……………27.4% ペントキサゾン〔オキサゾリジンジオン系〕……………8.2%	性状： 類白色水和性粘稠懸濁液体 毒性： 普通物 消防法： ——

【品目特性】……………

- 草笛ジャンボの項参照。
- 少量散布（10 a 当り 300 ml）。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

【使用上のポイント】……………

- 共通注意事項の 5，水稲除草剤散布 使用上のポイントを参照。
- 雑草の発生前から発生始期が本剤の散布適期である。
- 移植前に散布する場合は，散布後 7 日以上の間隔をあけて苗を移植する。
- クログワイ，コウキヤガラ，シズイ防除は，有効な後処理剤との組み合わせで使用する。

雑草名	散布適期
ホタルイ ミズガヤツリ ヘラオモダカ コウキヤガラ	発生前～発生始期まで
クログワイ シズイ	発生前

【薬効・薬害等の注意】……………

- 適用作物（水稲）の薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。
- 適用外作物（れんこん，くわい，せり）への薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。

【安全対策上の注意】……………

- 藻類に影響を及ぼすので，使用时並びに使用後も注意。

【適用と使用法】

作物名	適用雑草名	使用時期	10 a 当り 使用量	使用方法	本剤の 使用回数
移植水稻	水田一年生雑草 マツバイ ホタルイ ミズガヤツリ ヘラオモダカ	移植時	500 ml	田植同時散布機 で施用	1 回 ※
		植代時（移植前 7 日まで）		植代時に原液の まま散布し混和 する。	
		植代後～移植前 7 日 又は 移植直後～ノビエ 1 葉期 但し，移植後 30 日まで		原液湛水散布	
	水田一年生雑草 マツバイ ホタルイ ミズガヤツリ コウキヤガラ クログワイ シズイ	移植時	300 ml (少量散布)	田植同時散布機 で施用	
		植代後～移植前 7 日 又は移植直後～ノビエ 1 葉 期但し，移植後 30 日まで		原液湛水散布	

※クミルロンを含む農薬の総使用回数 ： 2 回以内

※ペントキサゾンを含む農薬の総使用回数： 2 回以内