

<b>シアントラニプロール・イソチアニル粒剤</b> <b>ルーチンデュオ箱粒剤</b>	<b>取扱メーカー：</b> バイエル  <b>原体メーカー：</b> FMC, 住友化学・バイエル
<b>成分：</b> シアントラニプロール〔アントラニリックジアミド系〕…0.75% イソチアニル〔チアジアゾールカルボキサミド系〕…2.0%	<b>性状：</b> 類白色細粒 <b>毒性：</b> 普通物 <b>消防法：</b> ——

### 【適用と使用方法】 .....

作物名	適用病害虫名	1箱 <sup>*</sup> 当り 使用量	使用時期	使用方法	総使用回数
稲	いもち病 イネミズゾウムシ イネドロオイムシ	1kg/10a	移植時	側条施用	本剤 1回 シアントラニプロール 1回 イソチアニル 3回以内 (直播での種時又は移植時 までの処理は1回以内, 本田 では2回以内)
稲 (箱育苗)	いもち病 白葉枯病 もみ枯細菌病 イネミズゾウムシ イネドロオイムシ フタオビコヤガ ニカメイチュウ ツマグロヨコバイ イネツトムシ コブノメイガ イナゴ類 イネヒメハモグリバエ ヒメトビウンカ 穂枯れ (ごま葉枯病菌) 内穎褐変病	50 g	は種前	育苗箱の 床土又は 覆土に均 一に混和 する。	本剤 1回 シアントラニプロール 1回 イソチアニル 3回以内 (移植時までの処理は1回以 内, 本田では2回以内)
			は種時 (覆土前) ～移植当日	育苗箱の 上から均 一に散布 する。	
	苗腐敗症 (もみ枯細菌病菌) 苗立枯細菌病		は種前	育苗箱の 床土又は 覆土に均 一に混和 する。	
			は種時 (覆土前)	育苗箱の 上から均 一に散布 する。	

\* 育苗箱は30×60×3 cm, 使用土壌約5 ℓ