

ビフェントリン水和剤 テルスター水和剤	取扱メーカー： 石原，O A T，日産，ホクサン 原体メーカー： エフエムシー
成分： ビフェントリン〔ピレスロイド系 PRTR・2種〕…2.0%	性状： 類白色水和性粉末45 μ m以下 毒性： 普通物 消防法： —

【品目特性】

- 幅広い殺虫スペクトラムを有し，果樹，茶，野菜などのチョウ目，カメムシ目と共に，アザミウマ類，ハダニ類にも卓効を示す。
- 接触作用により優れた速効性を示すとともに，忌避作用を有する。
- 光などに対し安定で残効期間が長く，より少ない散布回数で高い防除効果が得られる。
- 新梢伸長期や幼苗期でも使用できる。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

【使用上のポイント】

- 害虫の発生初期を中心に，他剤とのローテーションで散布する。
- 浸透移行性がないので，薬剤のかかりにくい葉裏にも丁寧に散布する。
- シンクイムシ類，ハモグリガ類，キンモンホソガなどの食入性害虫は食入前に散布する。
- ハマキムシ類などの巻葉性害虫には巻葉前に散布する。

【薬効・薬害等の注意】

- ボルドー液と混用する場合は使用直前に混用する。
- ばら，きく，カーネーションに使用する場合，収穫間際の散布は葉や花に汚れを生じる場合があるのでさける。

【安全対策上の注意】

- 低濃度でも長期間に渡ってミツバチ，マルハナバチに影響を与えるので，直接巣箱への飛散やドリフトが無いよう注意する。
- 共通注意事項7，ミツバチに対する注意事項を参照。
- 魚類，甲殻類に影響を及ぼすおそれがあるので，使用時は注意。
- 散布器具・容器の洗浄水及び空容器は適切に処理する。



【適用と使用法】.....

作物名	適用害虫名	希釈倍数	10 a 当り 使用液量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用 方法	ピフェントリンを含 む農薬の総使用回数	
りんご	モモシクイガ キンモンホソガ ギンモンハモグリガ ハマキムシ類 アブラムシ類 リンゴハダニ ナミハダニ	1000 倍	200 ～ 700 ℓ	前日まで	1 回	散布	1 回	
なし	シクイムシ類 ハマキムシ類 ナシチビガ アブラムシ類 ハダニ類	1000 ～ 2000 倍			2 回以内		2 回以内	2 回以内 (散布は 1 回以 内、くん煙は 1 回以内)
	カメムシ類			1000 倍			2 回以内	2 回以内
もも	モモハモグリガ アブラムシ類 カメムシ類	1000 倍		14 日前 まで	2 回以内		2 回以内 (散布は 1 回以 内、くん煙は 1 回以内)	
かき	カメムシ類 チャノキイロアザミウマ カキクダアザミウマ ハダニ類 カキノヒメヨコバイ	1000 ～ 2000 倍						1 回
	ぶどう	チャノキイロアザミウマ			1000 倍			
あけび (果 実)	アブラムシ類	1000 ～ 2000 倍		7 日前 まで	2 回以内		2 回以内	
びわ	アブラムシ類 オオタバコガ カメムシ類			前日まで	3 回以内		3 回以内	
かんきつ	ミカンハモグリガ チャノキイロアザミウマ カメムシ類 アブラムシ類 ワタミヒゲナガゾウムシ							21 日前 まで
ハスカップ	アブラムシ類			30 日前 まで	2 回以内		2 回以内	
ホ ッ プ	アズキノメイガ ハダニ類 アサトビハムシ	1000 倍	150 ～ 300 ℓ	前日まで	4 回以内	4 回以内		
す い か	アブラムシ類 ハダニ類				3 回以内	3 回以内		
メ ロ ン	アブラムシ類 ハダニ類 タバココナジラミ類 (シルバーリーフコナジラミを含む)						3 回以内	3 回以内
きゅうり	アブラムシ類 オンシツコナジラミ							
な す	アブラムシ類 オンシツコナジラミ ハダニ類							

作物名	適用害虫名	希釈倍数	10 a 当り 使用液量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用 方法	ビフェントリンを含 む農薬の総使用回数	
キャベツ はくさい	コナガ アオムシ ヨトウムシ アブラムシ類	1000 ～ 1500 倍	150 ～ 300 ℓ	21 日 前 まで	4 回以内	散布	4 回以内	
だいこん	アブラムシ類							2 回以内
ねぎ	シロイチモジヨトウ	1000 倍		7 日 前 まで	2 回以内		2 回以内	
パセリ			100 ～ 300 ℓ	3 日 前 まで				
ばれいしょ	アブラムシ類	1000 ～ 1500 倍						
てんさい		250 倍	100 ～ 300 ℓ	7 日 前 まで	4 回以内		4 回以内	
	ヨトウムシ	1000 ～ 1500 倍						
	カメノコハムシ	1500 倍						
	ハダニ類							
だいず	アブラムシ類	1000 倍			3 回以内		3 回以内	
いんげんまめ	アブラムシ類 インゲンマメゾウムシ		3 日 前 まで	3 回以内	3 回以内			
あずき	アズキノメイガ	1500 倍	150 ～ 300 ℓ	7 日 前 まで				
茶	チャノコカクモンハマキ チャハマキ チャノホソガ チャノミドリヒメヨコバイ チャノキイロアザミウマ カンザワハダニ ヨモギエダシヤク	1000 倍	200 ～ 400 ℓ	摘採 14 日 前 まで	2 回以内			2 回以内
	ヨトウムシ アブラムシ類 オンシツコナジラミ	1500 倍	25 ～ 180 ℓ	10 日 前 まで				
たばこ	スジキリヨトウ シバツトガ		300 ml /m ²	発生初期	3 回以内		3 回以内	
芝								
ばら きく カーネーション	ハダニ類	1000 倍	150 ～ 300 ℓ	—			3 回以内	
樹木類	ケムシ類		200 ～ 700 ℓ	発生初期	6 回以内	6 回以内		