## クロチアニジン・トリシクラゾール・バリダマイシン・フェリムゾン水和剤

## ノンブラスバリダダントツフロアブル

取扱メーカー:

協友アグリ

原体メーカー:

住友化学, ダウ, 住友化学,

住友化学

性状:淡赤色水和性粘稠懸濁液体 毒性:普通物

| **毒性**:普通物 | 消防法:——

## 

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	10 a 当り 使用液量	使用時期 (収穫前)	使用方法	総使用回数
稲	いもち病 紋枯病 ウンカ類 カメムシ類	8倍	800 mℓ	14日前 まで	無人へリ コプター による散 布	本剤 2回以内 クロチアニジン 4回以内 (直播でのは種時又は移植時まで の処理は1回以内,本田での散布, 空中散布,無人へり散布は合計3 回以内) トリシクラゾール 4回以内 (育苗箱への処理は1回以内,本 田では3回以内) バリダマイシン 6回以内 (育苗箱灌注は1回以内,本田で は5回以内) フェリムゾン 2回以内
		300倍	25 ℓ		散布	
	いもち病 紋枯病 穂枯れ (ごま葉枯病菌) ウンカ類 カメムシ類 イナゴ類	1000 倍	60 ∼ 150 ℓ			