

クロチアニジン・シアントラニプロール・イソチアニル粒剤 スタウトパディート DX 箱粒剤	取扱メーカー： 協友アグリ* 原体メーカー： 住友化学、FMC、 住友化学・バイエル
成分： クロチアニジン〔ネオニコチノイド系〕……………0.8% シアントラニプロール〔アントラニリックジアミド系〕…0.75% イソチアニル〔チアジアゾールカルボキサミド系〕…2.0%	性状： 類白色細粒 毒性： 普通物 消防法： ——

【適用と使用法】

作物名	適用病害虫名	1箱*当り 使用量	使用時期	使用方法	総使用回数
稲 (箱育苗)	いもち病 白葉枯病 もみ枯細菌病 内穎褐変病 イネミズソウムシ イネドロオイムシ ウンカ類 ツマグロヨコバイ イネツトムシ フタオビコヤガ ニカメイチュウ	50g	は種前	育苗箱の床土 又は覆土に均 一に混和する。	本剤 1回 クロチアニジン 4回以内 (移植時までの処理は1回以 内、本田での散布、空中散布、 無人ヘリ散布は合計3回以 内) シアントラニプロール 1回 イソチアニル 3回以内 (移植時までの処理は1回以 内、本田では2回以内)
	いもち病 白葉枯病 もみ枯細菌病 内穎褐変病 イネミズソウムシ イネドロオイムシ ウンカ類 ツマグロヨコバイ イネツトムシ フタオビコヤガ ニカメイチュウ 穂枯れ (ごま葉枯病菌)		は種時 (覆土前) ～移植当日	育苗箱の上か ら均一に散布 する。	
	苗腐敗症 (もみ枯細菌病菌) 苗立枯細菌病		は種前	育苗箱の床土 又は覆土に 均一に混和す る。	
			は種時 (覆土前)	育苗箱の上か ら均一に散布 する。	
	イナゴ類		移植3日前 ～移植当日	する。	

* 育苗箱は 30×60×3cm、使用土壌約 5ℓ