

チウラム水和剤 チウラム 80	取扱メーカー： ホクサン 原体メーカー： 大内新興
成分： チウラム〔有機硫黄 PRTR・1 種〕……………80.0% その他 PRTR 該当成分： 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩〔PRTR・1 種〕…1.8%	性状： 淡青緑色水和性粉末45 μ m以下 毒性： 普通物 消防法： ——

【品目特性】……………

- 種子の粉衣消毒，茎葉散布の殺菌剤として用いられる。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

【使用上のポイント】……………

- 種子粉衣の場合，薬剤と種子をよく付着させるため，適当な容器に入れてよく混合する。

【薬効・薬害等の注意】……………

- 共通注意事項 8，適用作物群に関する注意事項を参照。

【安全対策上の注意】……………

- 粉衣した種子は食用や家畜の飼料にしない。
- 粘膜を刺激する性質があり取扱いに注意する。
- 本剤を使用したつまみ菜・間引き菜等の幼植物を食用に供さない。
- 水産動物に強い影響を及ぼすおそれがあるので特に注意。
- 散布器具・容器の洗浄水及び空容器は適切に処理する。



【適用と使用方法】

作物名	適用病害名	希釈倍数 又は使用量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用方法	チウラムを含む 農薬の総使用回数
りんご	黒点病	1000～ 1500 倍	60日前 まで	5 回 以内	散布	5 回以内
芝	葉腐病（ブラウンパッチ） 等諸病害	250 倍	発病初期	8 回 以内	0.16～0.22 ℓ / m ² 散布	8 回以内
稲	いもち病 ごま葉枯病	2～5 g ／種子 1 kg	は種前	1 回	種子粉衣	1 回
豆類(種 実) 豆類(未成熟) てんさい たばこ 針 葉 樹	立枯病			—		—
れ ん げ				菌核病	5～10 g ／種子 1 kg	1 回
野 菜 類 豆 類（種 実）				フザリウム・リゾクトニア 菌による病害（立枯病等）	2～5 g ／種子 1 kg	
未 成 熟 とうもろこし				苗立枯病	5 g ／種子 1 kg	種子処理機 による種子 粉衣
飼 料 作 物				フザリウム・リゾクトニア 菌による病害（立枯病等）	2～5 g ／種子 1 kg	
花 き 類	フザリウム・リゾクトニア 菌による病害（苗立枯病， 萎黄病，立枯病等）	5 g ／種子 1 kg				