

<b>フェリムゾン・フサライド水和剤</b> <b>ブラシンゾル</b>	<b>取扱メーカー：</b> サンケイ＊，北興，住友化学  <b>原体メーカー：</b> 住友化学，住友化学
<b>成分：</b> フェリムゾン〔ピリミジン系 PRTR・1種〕……20.0% フサライド〔有機塩素系 PRTR・1種〕……15.0%	<b>性状：</b> 類白色水和性粘稠懸濁液体  <b>毒性：</b> 普通物 <b>消防法：</b> ——

### 【品目特性】 .....

- 空中散布・無人ヘリコプター散布専用剤で広域防除に適している。
- ブラシン粉剤D Lの項参照。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

### 【使用上のポイント】 .....

- 使用に際しては，容器をよく振ってから薬剤の所定量を取り出し，水に加えて，十分に攪拌する（長時間放置すると沈澱を生じることがあるが，振れば元の状態に戻る）。
- ブラシン粉剤D Lの項参照。

### 【薬効・薬害等の注意】 .....

- 散布液調製後は速やかに散布する。
- 適用外作物（たばこ，けいとう，だいず，あずき，いんげんまめ）への薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。

### 【安全対策上の注意】 .....

- 空中散布及び無人ヘリコプター散布の際は，共通注意事項の2．空中散布及び無人航空機（無人ヘリコプター等）による散布・滴下に関する注意事項を参照。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯する。



### 【適用と使用法】 .....

作物名	適用病害名	希釈 倍数	10 a 当り 使用液量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用方法	フェリムゾンを含む 農業の総使用回数	フサライドを含む 農業の総使用回数
稲	いもち病	原液	120 ml	7 日前 まで	2 回以内	空中散布	2 回以内	3 回以内
		30 倍	3 ℓ					
	穂枯れ (ごま葉枯病菌) 内穎褐変病 もみ枯細菌病	8 倍	800 ml			無人ヘリコ プターによ る散布		