

<b>アセフェート粒剤</b> <b>オルトラン粒剤</b>	<b>取扱メーカー：</b> 北興、アリスタLS、一農、琉産  <b>原体メーカー：</b> アリスタLS
<b>成分：</b> アセフェート〔有機リン系 PRTR・1種〕……………5.0%	<b>性状：</b> 類白色細粒 <b>毒性：</b> 普通物 <b>消防法：</b> ——

### 【品目特性】……………

- 低毒性の浸透移行性有機リン殺虫剤である。
- 定植時の土壌処理によって根から植物体内に浸透して殺虫効果を現わし、効力の持続期間も長い。
- 吸水性、食害性の広範囲の害虫に効力を示す。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

### 【使用上のポイント】……………

- 定植時の植穴散布と作条散布ができる。
- 定植時に植穴散布の場合、土とよく混合したり、間土をして薬剤と根が直接ふれないようにする。
- 芝のスジキリヨトウ、シバツトガ及びタマヤナガの防除に使用する場合、散布後10 a 当り500～1000 l の散水处理が有効である。
- いぐさ・れんこんに使用する場合は、水の出入を止めて湛水のまま田面に均一に散布し、少なくとも7日間は湛水状態を保ち落水、かけ流しはしない。
- 土壌が極度に乾燥している時は使用しない（効果）。
- たばこのヨトウムシ防除では、処理時期から発生までの期間が長くなった場合、他の散布剤と併用する。

### 【薬効・薬害等の注意】……………

- 適用作物（たばこ）の薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。
- 共通注意事項8. 適用作物群に関する注意事項を参照。

### 【安全対策上の注意】……………

- 周辺の桑葉にはかからないようにする（蚕毒）。
- つまみ菜、間引き菜には使用しない。
- 無人航空機散布の際は、共通注意事項の2. 空中散布及び無人航空機（無人ヘリコプター等）による散布・滴下に関する注意事項を参照。
- 共通注意事項6. 街路・公園・堤とう等で使用する場合は注意事項を参照。
- 共通注意事項7. ミツバチに対する注意事項を参照。



【適用と使用方法】 .....

作物名	適用害虫名	10 a 当り 使用量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用方法	アセフェートを含む 農業の総使用回数	
キ ャ ベ ツ	アオムシ コナガ ヨトウムシ アブラムシ類	3～6 kg (1 株当り) 1～2 g	定植時	1 回	植穴処理	2 回以内 (定植時までの 処理は 1 回以 内, 定植後の散 布は 1 回以内)	
	アザミウマ類	6 kg (1 株当り) 2 g					
	アブラムシ類	1 m <sup>2</sup> 当り 6 g	育苗期				
ト マ ト	アブラムシ類 オンシツコナジラミ	3～6 kg (1 株当り) 1～2 g	定植時		1 回	作条散布又は 植穴処理	1 回
き ゆ う り な す	アザミウマ類 アブラムシ類 オンシツコナジラミ						
ピーマン	アブラムシ類	1 株当り 2 g				株元散布	
は く さい	ヨトウムシ コナガ アオムシ アブラムシ類	3～6 kg (1 株当り) 1～2 g				植穴処理	
こ ま つ な	アブラムシ類	6 kg	は種前			播溝土壌混和	
ブロッコリー	ヨトウムシ アザミウマ類	6 kg (1 株当り) 2 g	定植時			株元散布	
だいこん	アオムシ コナガ アブラムシ類	3～4 kg	は種前		作条散布		
かぶ	アブラムシ類	4 kg	21 日前まで		2 回 以内	散布 無人航空機に よる散布	2 回以内 (株元散布は 1 回以内, 散布 は 1 回以内)
ごぼう		3～6 kg	75 日前まで				
れんこん		4 kg	14 日前まで	1 回 以内	作条散布	3 回以内 (植付時の処理は 1 回以内, 植付 後は 2 回以内)	
ばれいしょ		3～6 kg (1 株当り) 1～2 g	植付時				
えだまめ	ハスモンヨトウ	3～6 kg	21 日前まで	3 回 以内	生育期株元散布	3 回以内	
なばな	アブラムシ類	6 kg	定植時	1 回	植溝土壌混和	1 回	
			は種時		播溝土壌混和		
花き類 ・観葉植物	アザミウマ類 アブラムシ類	3～6 kg	発生初期	5 回 以内	株元散布	5 回以内	
	ヨトウムシ類	6 kg					
つつじ類	ツツジグンバイ	12 kg					
宿根スターチス	コガネムシ類幼虫	6 kg					
カーネーション	コナガ						
アリウム	ネギコガ						

作物名	適病害虫名	10 a 当り 使用量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用方法	アセフェートを含む 農薬の総使用回数
き く	ネキリムシ類 ハモグリバエ類	6 kg	発生初期	5 回 以内	株元散布	5 回以内
た で あ い	アブラムシ類	セル成型育苗 トレイ1箱又は ペーパー ポット1冊(30 ×60cm・使用 土壌約1.5～4 ℓ)当り50g	定植時	1 回	本剤の所定量を セル成型育苗ト レイ又はペー パーポットの上 から均一に散布 する。	1 回
		6 kg			株元散布	
い ぐ さ	イグサシンムシガ	4 kg	生育期	2 回 以内	湛水散布	2 回以内
芝	スジキリヨトウ シバツトガ	10kg	発生初期	5 回 以内	全面散布	5 回以内
	タマナヤガ	5～10kg				
た ば こ	ヨトウムシ ネキリムシ アブラムシ類 アザミウマ類 ジャガイモガ ヤサイゾウムシ	3～6 kg	移植前	1 回	作条散布後 土壌混和	2 回以内
	アブラムシ類		本畑初期		株元散布	