

フロニカミド水和剤 ウララ50DF	取扱メーカー： 石原 原体メーカー： 石原産業
成分： フロニカミド……………50.0%	性状： 淡褐色水和性細粒 毒性： 普通物 消防法： ——

【品目特性】……………

●新規系統の殺虫剤であり、既存剤に対する感受性が低下した害虫に対しても優れた効果を示す。

●アブラムシ類に対しては、種に関わらず高い効果を示す。

●高い浸透移行性を有し、葉表から葉裏、あるいは巻葉内や新梢へも移行するので、密植栽培のアブラムシ防除にも適している。

●有効成分は植物体中に速やかに取り込まれるため、残効性、耐雨性に優れる。

●カブリダニ類、寄生蜂などの天敵昆虫や、ミツバチ、マルハナバチなどの訪花昆虫にほとんど影響なく、IPM防除体系の一剤として適する。

●有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

【使用上のポイント】……………

●アブラムシ類の吸汁を阻害し衰弱死に至らせるまでに、見かけ上は数日かかるが、吸汁阻害は速効的であり、同時に害虫の加害活動も停止する。

【薬効・薬害等の注意】……………

●散布液量は、対象作物の生育段階、栽培形態及び散布方法に合わせ調節する。

【安全対策上の注意】……………

●散布液調製時には保護メガネを着用し、薬剤が眼に入らないように注意。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受ける（粉末は刺激性）。



【適用と使用法】……………

作物名	適用害虫名	希釈倍数	10 a 当り 使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	フロニカミドを含む 農薬の総使用回数
か ん き つ (みかんを除く)	アブラムシ類	10000倍	200～ 700 ℓ	14 日前 まで	3 回以内	散布	3 回以内
み か ん	アザミウマ類	5000～ 10000倍		7 日前 まで	2 回以内		2 回以内
ば ら チューリップ ゆ り	アブラムシ類	10000 倍	100～ 300 ℓ	発生初期	6 回以内		6 回以内
き く		5000～ 10000 倍					
カーネーション	モモアカアブラムシ	10000 倍					