

<b>クロチアニジン粒剤</b> <b>ダントツ箱粒剤</b>	<b>取扱メーカー：</b> 協友アグリ、住友化学  <b>原体メーカー：</b> 住友化学
<b>成分：</b> クロチアニジン〔ネオニコチノイド系〕……………1.5%	<b>性状：</b> 類白色細粒 <b>毒性：</b> 普通物 <b>消防法：</b> —

### 【品目特性】……………

- 長期持続型の育苗箱用殺虫剤である。
- 水稻の初期害虫であるイネミズゾウムシ、イネドロオイムシからツマグロヨコバイ、飛来性のウンカ類まで高い防除効果を示す。
- 浸透移行性に優れ、長期間効果が持続する。
- 有用天敵のクモ類に対する影響が少ない。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

### 【薬効・薬害等の注意】……………

- 育苗箱の上から均一に散布し、葉に付着した薬剤は払い落とす。

- イネクロカメムシに対しては残効性に注意する。
- 軟弱徒長苗、ムレ苗、移植適期を過ぎた苗などには薬害を生じるおそれがあるので注意する。
- 誤って過剰に使用したり、本剤使用後4日以上移植せずに育苗箱中におくと、葉枯れなどの薬害を生じることもあるので、所定の使用量、使用時期、使用方法を厳守する。
- 本田の整地が不均整な場合は薬害を生じやすいので、代かきは丁寧に行い、移植後田面が露出したりしないように注意する。
- 移植後は直ちに入水し、水深2～3cm程度を保ち浅水はさける。

### 【適用と使用法】……………

作物名	適用害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロチアニジンを含む農薬の総使用回数
湛水直播 水稻	イネミズゾウムシ イネドロオイムシ	1kg/10a	は種時	1回	は種同時施 薬機を用い て土中施用 する。	4回以内 (は種時までの 処理は1回以内、 本田での散布、 空中散布、無人 航空機散布は合 計3回以内)
稲 (箱育苗)	ウンカ類 ツマグロヨコバイ イネミズゾウムシ イネドロオイムシ ニカメイチュウ フタオビコヤガ イネヒメハモグリバエ イネクロカメムシ	育苗箱 (30 ×60×3cm、 使用土壌約 5ℓ) 1箱 当り 50g	移植3日前 ～移植当日		育苗箱の上 から均一に 散布する	4回以内 (移植時までの 処理は1回以内、 本田での散布、 空中散布、無人 航空機散布は合 計3回以内)