

エトフェンプロックス・アゾキシストロビン水和剤 アミスタートレボン S E	取扱メーカー： 協友アグリ，サンケイ＊ 原体メーカー： 三井アグロ，シンジェンタ
成分： エトフェンプロックス〔ピレスロイド系 PRTR・1種〕…10.0% アゾキシストロビン〔ストロビルリン系 PRTR・1種〕…8.0%	性状： 類白色水和性粘稠懸濁液体 毒性： 普通物 消防法： —

【適用と使用方法】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	10 a 当り 使用液量	使用時期 (収穫前)	使用方法	総使用回数
稲	いもち病 紋枯病 カメムシ類 ウンカ類 ツマグロヨコバイ	1000倍	60～ 150 ℓ	14日前まで	散布	本剤 3回以内 エトフェンプロックス 3回以内 アゾキシストロビン 4回以内 (育苗箱散布は1回以内、 本田では3回以内)
		300倍	25 ℓ			
		30倍	3 ℓ			
	8倍	800 ml	無人航空機 による散布			
だいず	紫斑病 カメムシ類 マメシンクイガ アブラムシ類	1000倍	100～ 400 ℓ	21日前まで	散布	本剤 2回以内 エトフェンプロックス 2回以内 アゾキシストロビン 2回以内
	紫斑病 カメムシ類 マメシンクイガ	8倍	800 ml		無人航空機 による散布	