

シベルメトリン乳剤 アグロスリン乳剤	取扱メーカー： クミカ、日農、住友化学、琉産 原体メーカー： 住友化学
成分： シベルメトリン〔ピレスロイド系〕……………6.0% その他 PRTR 該当成分： エチルベンゼン〔PRTR・1種〕……………42% キシレン〔PRTR・1種〕……………42%	性状： 淡黄色澄明可乳化油状液体 毒性： 劇物 消防法： 第4類・第2石油類（非水溶性）・危険等級Ⅲ

【品目特性】……………

- アグロスリン水和剤の項参照。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

【使用上のポイント】……………

- 残効性と忌避性を生かして、害虫発生初期に使用するとより効果的である。
- 浸透移行性・ガス効果が弱いので、薬液をムラなく散布する。特に薬液のかかりにくい葉裏、下葉などにも十分散布する。

【薬効・薬害等の注意】……………

- ボルドー液と混用する場合は使用直前に混合する。
- ねぎのシロイチモジヨトウに散布する場合は、食入前の若齢幼虫期に散布する。
- かんきつでの散布は、場合によりハダニ類が増えることがあるので注意する。
- 共通注意事項8、適用作物群に関する注意事項を参照。

【安全対策上の注意】……………

- 摘果などの作業の際は、農業用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用する。
- 共通注意事項6、街路・公園・堤とう等で使用する場合の注意事項を参照。
- 本剤で処理したえんばくの種子は食用及び飼料用には用いない。
- 無人ヘリコプター散布の際は、共通注意事項の2、空中散布及び無人航空機（無人ヘリコプター等）による散布・滴下に関する注意事項を参照。
- 魚類に強い影響を及ぼすおそれがあるので特に注意。
- 甲殻類に影響を及ぼすおそれがあるので、使用時は注意。
- 散布器具・容器の洗浄水及び空容器は適切に処理する。
- 共通注意事項7、ミツバチに対する注意事項を参照。



【適用と使用法】……………

作物名	適用害虫名	希釈倍数	10 a 当り 使用液量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用方法	シベルメトリンを含む 農薬の総使用回数
かんきつ	チャノキイロアザミウマ ミカンハモグリガ アブラムシ類	1000～ 2000 倍	200～ 700 ℓ	7日前まで	3回以内	散布	3回以内
	コアオハナムグリ ケシキスイ類 カメムシ類	2000 倍					
キウイフルーツ	キイロマイコガ	1000～ 2000 倍					
	キウイヒメヨコバイ カメムシ類	2000 倍					

作物名	適用害虫名	希釈倍数	10 a 当り 使用液量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用方法	シベルメトリンを含む 農薬の総使用回数									
麦 類	アブラムシ類	2000 倍	60～ 150 ℓ	21日前まで	3回以内	散布	3回以内									
とうもろこし	アワノメイガ	1000～ 2000 倍	100～ 300 ℓ	7日前まで												
	アワヨトウ	1000 倍														
	アブラムシ類	2000 倍														
だ い ず	マメシクイガ カメムシ類 フタスジヒメハムシ ジャガイモヒゲナガアブラムシ															
	マメシクイガ カメムシ類 フタスジヒメハムシ															
	アブラムシ類 ノメイガ類															
えだまめ	アブラムシ類 インゲンテントウ															
あ ず き	アブラムシ類 ノメイガ類															
いんげんまめ さやいんげん 未成熟さざげ	アブラムシ類															
きゅうり	アブラムシ類 オンシツコナジラミ ミナミキイロアザミウマ トマトハモグリバエ	1000 倍		前日まで	5回以内	5回以内										
	アブラムシ類	2000 倍														
	す い か	ミナミキイロアザミウマ					1000～ 2000 倍									
メ ロ ン	アブラムシ類	2000 倍					7日前まで	4回以内	4回以内							
	ミナミキイロアザミウマ トマトハモグリバエ	1000 倍														
	アブラムシ類 アザミウマ類 ハスモンヨトウ	2000 倍														
へばかぼちゃ (種子)	ヨトウムシ															
ト マ ト	アブラムシ類 オンシツコナジラミ ミナミキイロアザミウマ									前日まで	5回以内	5回以内				
な す	アブラムシ類															
ピーマン いちご	アブラムシ類	100～ 500 ℓ		3回以内	3回以内											
アスパラガス	ヨトウムシ															
ね ぎ	シロイチモジヨトウ	1000 倍		100～ 300 ℓ	7日前まで	5回以内				5回以内						
	アブラムシ類 ネギコガ ネギハモグリバエ アザミウマ類	2000 倍					3日前まで	2回以内	2回以内							
わ け ぎ	シロイチモジヨトウ				1000 倍											

作物名	適用害虫名	希釈倍数	10 a 当り 使用液量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用方法	シベルメトリンを含む農薬の総使用回数	
たまねぎ	アザミウマ類 シロイチモジヨトウ ネギハモグリバエ	2000 倍	100～ 300 ℓ	7日前まで	5回以内	散布	5回以内	
	アザミウマ類 シロイチモジヨトウ	48 倍	2.4 ℓ			無人ヘリ コプター による散布		
にんじん	ヨトウムシ	2000 倍	100～ 300 ℓ		2回以内	散布	2回以内	
にら	ネギアザミウマ ヨトウムシ類	2000 倍	100～ 300 ℓ	前日まで	3回以内	散布	3回以内	
にら(花茎)	ネギコガ ハモグリバエ類				5回以内			
ごぼう	アブラムシ類			14日前まで				
ほうれんそう	ヨトウムシ アブラムシ類	21日前まで		5回以内			5回以内	
	ミナミキイロアザミウマ				1000 倍			
チンゲンサイ	アオムシ アブラムシ類	2000 倍		前日まで	2回以内		散布	2回以内
非結球あぶらな科葉菜類 (チンゲンサイ、ケールを除く)	アブラムシ類				7日前まで			5回以内 2回以内
レタス				前日まで				3回以内
非結球レタス					3日前まで			5回以内 2回以内
葉にんにく らっきょう	ネギアザミウマ			7日前まで	1回			1回
エンサイ	ハスモンヨトウ							
しそ科葉菜類 (しそ、バジルを除く)	アブラムシ類			3日前まで	2回以内	2回以内		
しそ	ヒシモンヨコバイ アブラムシ類							
しそ(花穂) バジル	アブラムシ類			3日前まで	1回	1回		
食用ぎく	アブラムシ類 アザミウマ類 オオタバコガ ハスモンヨトウ ヨトウムシ							14日前まで
食用ブリムラ 食用金魚草 食用エキザカム 食用カーネーション 食用せんにちこう 食用トレニア 食用なでしこ 食用パンジー	アブラムシ類	1500 倍						
飼料用えんばく (は種用種子)	コクヌストモドキ	300 倍	種子 1kg 当り 希釈液 20 ml	貯蔵前	1 回	種子吹き 付け処理 又は塗末 処理	1 回	

作物名	適用害虫名	希釈倍数	10 a 当り 使用液量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用方法	シベルメトリンを含 む農薬の総使用回数
た ば こ	タバコアオムシ ヨトウムシ	2000～ 3000倍	25～ 180 ℓ	発生初期 ～10日前 まで	2回以内	散布	2回以内
	アブラムシ類 オンシツコナジラミ	2000倍					
き く	アブラムシ類		100～ 300 ℓ	発生初期	6回以内		6回以内
カーネーション	アブラムシ類 ヨトウムシ類						
し き み さ か き	アブラムシ類		200～ 700 ℓ				