フェンブコナゾール・マンゼブ水和剤

どさんこスター水和剤

取扱メーカー: クミカ

原体メーカー:

セレクサアグリ,ダウ

性状:淡黄色水和性粉末45μm以下 毒性:普通物

海性・普通物

ヘキサメチレンテトラミン [PRTR・1種] ………1.6%

- ●マンゼブは病原菌の植物体への侵入を阻止する。フェンブコナゾールはエルゴステロール生合成を阻害し、殺菌効果を示す。
- ●浸達性と長い残効性により、安定した効果を発 揮する。
- ●異なる作用機構の混合剤であり、薬剤耐性菌の 発達リスクを抑える。

【使用上のポイント】……… 〈てんさい〉

- ●てんさいに対して希釈倍数125倍で使用する場合は、少量散布に適合したノズルを装着した速度 連動式地上液剤散布装置を使用する。
- ●褐斑病に対し予防効果と治療効果を有し、発生 前〜発生初期に散布を行うことで優れた防除効果 を発揮する。

【安全対策上の注意】 ……………

- ●眼に対して弱い刺激性があるので眼に入らないよう注意する。眼に入った場合には直ちに水洗する。
- ●蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはか からないようにする。
- ●夏期高温時の使用をさける。







【適用と使用法】……

作物名	適用 病害名	希釈 倍数	10 a 当り 使用液量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用方法	フェンブコナゾールを 含む農薬の総使用回数	マンゼブを含む農薬の総使用回数
たまねぎ	灰色かび病 小菌核病 べと病	500倍	100 ~ 300 ℓ	3日前 まで	3回以内	- 散布	3回以内	- 5回以内
てんさい	褐斑病 葉腐病 褐斑病			21日前 まで	4回以内		4回以内	