

<b>シプロジニル水和剤</b> <b>ユニックス顆粒水和剤 47</b>	<b>取扱メーカー：</b> シンジェンタ  <b>原体メーカー：</b> シンジェンタ
<b>成分：</b> シプロジニル〔アニリノピリミジン系〕……………50.0%	<b>性状：</b> 淡褐色水和性細粒 <b>毒性：</b> 普通物 <b>消防法：</b> ——

### 【品目特性】……………

- アニリノピリミジン系の浸透性殺菌剤。
- 植物組織中に浸透しやすく耐雨性に優れている。また、予防効果・治療効果を併わせ持っている。
- 有益昆虫（マメコバチなど）にはほとんど影響がない。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

### 【使用上のポイント】……………

- りんごのモニリア病に対しては、葉腐れの初期病斑発見直後に使用する。
- 過度の連用はさけ、なるべく作用性の異なる薬剤と輪番で使用する。

### 【薬効・薬害等の注意】……………

- 適用外作物（おうとう）への薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。
- 散布量は、対象作物の生育段階、栽培形態及び散布方法に合わせ調整する。
- くり返し使用する場合は散布間隔を7日以上あける。

### 【安全対策上の注意】……………

- 蚕に影響を及ぼすおそれがあるので、周辺の桑葉にはかからないようにする。
- 甲殻類に影響を及ぼすおそれがあるので、使用時は注意。
- 散布器具・容器の洗浄水及び空容器は適切に処理する。



### 【適用と使用法】……………

作物名	適用病害名	希釈倍数	10 a 当り 使用液量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用方法	本剤及びシプロジニルを 含む農薬の総使用回数
りんご	褐斑病	2000 倍	200 ～ 700 ℓ	14 日前まで	4 回以内	散布	4 回以内
	黒星病 斑点落葉病	1000 ～ 2000 倍					
	うどんこ病 モニリア病	1000 倍		21 日前まで	3 回以内		3 回以内
な し	黒星病	2000 倍					
	黒斑病	1000 ～ 2000 倍	100 ～ 150 ℓ	45 日前まで	2 回以内	2 回以内	
小 麦	うどんこ病	700 ～ 1000 倍					
	眼紋病	500 ～ 700 倍					