エトフェンプロックス乳剤

トレボンエアー

取扱メーカー:

協友アグリ, クミカ, サンケイ,

ホクサン

原体メーカー: 三井アグロ

成分:エトフェンプロックス [ピレスロイド系 PRTR・1種] …10.0%

性状:類白色粘稠乳濁液体

毒性:普通物 消防法:——

- ●空中散布・無人へり散布で水稲・小麦・だいず・ あずき・やまのいも・しょうがの害虫防除が可能。
- ●有効成分を水中に乳化分散させた,水をベース とした製剤なので有機溶剤の臭いが少い。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一 覧表」を参照。

【安全対策トの注意】 …………

- ●空中散布による少量散布の際は、微量散布装置 以外の散布器具は使用しない。
- ●空中散布及び無人へリコプター散布の際は、共通注意事項2.空中散布及び無人航空機(無人へリコプター等)による散布・滴下に関する注意事項を参照。
- ●誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに 医師の手当を受けさせる。
- ●眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意する。 眼に入った場合には直ちに水洗し,眼科医の手当を受ける。

- ●甲殻類、冷水魚に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用する。養殖池等周辺での使用はさける。なお、比較的低濃度でも魚が平衡失調を起こすおそれがあるので十分注意する。
- ●共通注意事項7. ミツバチに関する注意事項を 参昭。







作物名	適用害虫名	希釈倍数	10 a 当り 使用液量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用方法	エトフェンプロックスを 含む農薬の総使用回数
稲	コブノメイガ イナゴ類 ウンカ類 カメムシ類 ツマグロヨコバイ	30倍	3 ℓ		3回以内	空中散布	3回以内
	イナゴ類 ウンカ類 カメムシ類 ツマグロヨコバイ	8倍		14日前 まで			
	コブノメイガ イナゴ類 ウンカ類 カメムシ類 ツマグロヨコバイ フタオビコヤガ		0.8 ℓ			- 無人へリ コブター による散布	
小麦だいず	ヒメトビウンカ ハスモンヨトウ カメムシ類				2回以内		2回以内
あずき しょうが	アズキノメイガ		1.6 ℓ	7日前 まで	3回以内		3回以内
やまのいも	ヤマノイモコガ アブラムシ類		3.2 ℓ	14日前 まで			