

クロチアニジン・クロラントラニプロール・イソチアニル・フラメトビル粒剤 フルターボ箱粒剤	取扱メーカー： クミカ 原体メーカー： 住友化学、FMC、 住友化学・バイエル、住友化学
成分：クロチアニジン〔ネオニコチノイド系〕……………1.5% クロラントラニプロール〔アントラニリックジアミド系〕…0.75% イソチアニル〔チアジアゾールカルボキサミド系〕…2.0% フラメトビル〔酸アミド系〕……………4.0%	性状：類白色及び淡褐色細粒 毒性：普通物 消防法：——

【適用と使用方法】

作物名	適用病害虫名	1箱 [*] 当り 使用量	使用時期	使用方法	総使用回数
稲 (箱育苗)	いもち病 紋枯病 白葉枯病 もみ枯細菌病 内穎褐変病 穂枯れ (ごま葉枯病菌) ウンカ類 ツマグロヨコバイ イネミズゾウムシ イネドロオイムシ ニカメイチュウ イネツトムシ フタオビコヤガ イネヒメハモグリバエ コブノメイガ	50g	移植3日前 ～移植当日	育苗箱の上 から均一に 散布する。	本剤 1回 クロチアニジン 4回以内 (移植時までの処理は1回 以内、本田での散布、空 中散布、無人航空機散布 は合計3回以内) クロラントラニプロール 1回 イソチアニル 3回以内 (移植時までの処理は1回 以内、本田では2回以内) フラメトビル 2回以内 (移植時までの処理は1回 以内)

* 育苗箱は30×60×3cm、使用土壌約5ℓ