

イブフェンカルバゾン・テフリルトリオン・ベンスルフロンメチル剤 カチボン (1キロ粒剤51/ Lジャンボ / Lフロアブル)	取扱メーカー： 北興 原体メーカー： 北興、全農・バイエル・北興、クミカ
成分： イブフェンカルバゾン(トリアゾリノン系)……2.5% (粒剤), 8.3% (ジャンボ), 5.0% (フロアブル) テフリルトリオン(トリケトン系)……2.0% (粒剤), 6.7% (ジャンボ), 4.0% (フロアブル) ベンスルフロンメチル(スルホニルウレア系)……0.51% (粒剤), 1.7% (ジャンボ), 1.0% (フロアブル) その他 PRTR 該当成分： ドデシル硫酸ナトリウム(PRTR・1種)……1.2% (ジャンボ)	性状： 類白色細粒 (粒剤) 淡褐色細粒, 水溶性パック入り 1パック30g(ジャンボ) 類白色水和性粘稠懸濁液体 (フロアブル) 毒性： 普通物 消防法： ——

【品目特性】…………… 〈共通〉

- 水稲に対して高い安全性を示す。
- スルホニルウレア抵抗性雑草 (特に広葉雑草) に高い効果を示す。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

【使用上のポイント】……………

- 共通注意事項の5. 水稲除草剤散布 使用上のポイントを参照。
- ノビエの2.5葉期までに散布する。
- 多年生雑草は生育段階によって効果にフレがあるので、必ず適期に散布する。

雑草名	散布適期		
	粒剤	ジャンボ	フロアブル
ホタルイ	2葉期まで	2葉期まで(直播水稲は3葉期まで)	2葉期まで
ミズガヤツリ ウリカワ	2葉期まで		
クログワイ オモダカ	発生前～発生始期まで		
ヒルムシロ	発生期まで		
セリ	再生前～再生始期まで		
アオミドロ・ 藻類による 表層は離	発生前まで		発生前

- オモダカ、クログワイは発生期間が長く、遅い発生のものまでは十分な効果を示さない場合があるので、必要に応じて有効な後処理剤と組み合わせ使用する。

〈粒剤〉

- 田植同時処理で施用する場合、終了後はできるだけ速やかに入水する。

【薬効・薬害等の注意】…………… 〈共通〉

- 共通注意事項の5. 水稲除草剤 薬効・薬害等の注意を参照。
- 適用作物 (水稲) 及び適用外作物 (いぐさ、れんこん、せり、くわい等) への薬害等の注意は「薬害注意事項解説」を参照。

〈粒剤・ジャンボ〉

- 直播水稲で使用する場合、稲の根が露出する条件下では薬害を生じるおそれがあるので使用をさける。
- 散布後に低温傾向が続くと予想される時には、雑草に対する効果が劣ることがある。

【安全対策上の注意】…………… 〈共通〉

- 藻類に影響を及ぼすので、使用時並びに使用後も注意。

〈粒剤・フロアブル〉

- 無人ヘリコプター散布・滴下の際は、共通注意事項の2. 空中散布及び無人航空機 (無人ヘリコプター等) による散布・滴下に関する注意事項を参照。
- 周辺の桑葉にかからないようにする (蚕毒)。



【適用と使用方法】

①カチボンシキロ粒剤51

作物名	適用雑草名	使用時期	10 a 当り 使用量	使用方法	本剤の 使用回数
移植水稻	水田一年生雑草 マツバイ ホタルイ ミズガヤツリ ウリカワ クログワイ オモダカ ヒルムシロ セリ アオミドロ・藻類による 表層はく離	移植時	1 kg	田植同時散布機 で施用	1 回 ※
		移植直後～ ノビエ2.5葉期 但し、 移植後30日まで		湛水散布又は 無人ヘリコプ ターによる散布	
直播水稻	水田一年生雑草 ホタルイ ウリカワ ミズガヤツリ ヒルムシロ セリ	稲1葉期～ ノビエ2.5葉期 但し、 収穫90日前まで			

※イプフェンカルバゾンを含む農薬の総使用回数：2回以内

※テフリトリオンを含む農薬の総使用回数：2回以内

※ベンスルフロンメチルを含む農薬の総使用回数：2回以内

②カチボンシLジャンボ

作物名	適用雑草名	使用時期	10 a 当り 使用量	使用方法	本剤の 使用回数
移植水稻	水田一年生雑草 マツバイ ホタルイ ミズガヤツリ ウリカワ クログワイ オモダカ ヒルムシロ セリ アオミドロ・藻類による 表層はく離	移植直後～ ノビエ2.5葉期 但し、 移植後30日まで	小包装 (バック) 10個 (300g)	水田に小包装 (バック) のま ま投げ入れる。	1 回 ※
直播水稻	水田一年生雑草 マツバイ ホタルイ ミズガヤツリ ウリカワ ヒルムシロ セリ アオミドロ・藻類による 表層はく離	稲1葉期～ ノビエ2.5葉期 但し、 収穫90日前まで			

※イプフェンカルバゾンを含む農薬の総使用回数：2回以内

※テフリトリオンを含む農薬の総使用回数：2回以内

※ベンスルフロンメチルを含む農薬の総使用回数：2回以内

③カチボシLFフロアブル

作物名	適用雑草名	使用時期	10 a 当り 使用量	使用方法	本剤の 使用回数
移植水稻	水田一年生雑草 マツバイ ホタルイ ミズガヤツリ ウリカワ クログワイ オモダカ ヒルムシロ セリ アオミドロ・藻類による 表層はく離	移植時	500 ml	田植同時散布機で 施用	1 回 ※
		移植直後～ ノビエ2.5葉期 但し、 移植後30日まで		原液湛水散布、 水口施用 又は 無人ヘリコプター による滴下	
直播水稻	水田一年生雑草 マツバイ ホタルイ ミズガヤツリ ウリカワ ヒルムシロ セリ アオミドロ・藻類による 表層はく離	稲1葉期～ ノビエ2.5葉期 但し、 収穫90日前まで		原液湛水散布 又は 無人ヘリコプター による滴下	

※イブフェンカルバゾンを含む農薬の総使用回数：2回以内

※テフリトリオンを含む農薬の総使用回数：2回以内

※ペンスルフロンメチルを含む農薬の総使用回数：2回以内