

# アーザラン液剤

成分：アシュラム……………37.0%

毒性：普通物

## 【適用と使用法】……………

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	10 a 当り使用量		本剤の使用回数	使用方法	適用地帯	アシュラムを含む農薬の総使用回数
				使用量又は希釈回数	使用液量				
ほうれんそう	—	一年生雑草	は種後～子葉展開期	秋播き 600～800㎖ 春～初夏播き 800～1000㎖ 但し芽出し播き は800㎖	100～200ℓ	1回	全面土壌散布	—	1回
さとうきび 飼料用さとうきび		一年生雑草、 多年生雑草	雑草生育期 但し、 収穫30日前まで	800～1000㎖	150～200ℓ	3回以内	雑草茎葉散布		3回以内
桑		一年生雑草、キク科、タデ科の 多年生雑草	桑発芽前 又は 桑刈取直後	750㎖	100～150ℓ	4回以内	全面土壌散布		4回以内
		キク科、ヒルガオ科、タデ科の 多年生雑草	雑草生育期	30～50倍	1㎡当り 約100㎖		雑草茎葉散布 (局所処理)		
すぎ (下刈り)		ススキ	6月	20倍	300㎖/株径 30㎝の株	3回以内			3回以内
		アレチノギク、カラムシ、シシウド等の大型雑草	雑草発生期		60ℓ				
		クズ	6～7月	10倍	50ℓ				
しそ		一年生雑草	生育期（本葉2～3葉期）但し、 収穫45日前まで 展開葉4葉期以降 但し、 収穫45日前まで （雑草発生初期）	500㎖	100ℓ	1回	雑草茎葉散布		1回
えごま (種子)									
おかひじき			は種直後	600㎖	100～150ℓ		全面土壌散布		
樹木等	公園 庭園 堤とう 駐車場 道路 運動場 宅地 のり面等	一年生雑草	雑草生育期	1000～2000㎖	100～200ℓ	3回以内	植栽地を除く樹木等の周辺地に雑草茎葉散布	3回以内	
		多年生広葉雑草		2000～3000㎖					
		多年生イネ科雑草		3000～5000㎖					
		クズ		5000㎖					
水田作物 (水田畦畔)	水田畦畔	一年生雑草、キク科、タデ科の多年生雑草		1500～3000㎖			雑草茎葉散布		

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	10 a 当り使用量		本剤の使用回数	使用方法	適用地帯	アシュラムを含む農薬の総使用回数
				使用量又は希釈倍数	使用液量				
牧 草	牧野草地	ギシギシ類及びキク科の雑草	秋期経年草地のギシギシ類の栄養生長期但し、最終採草後	300～400 ml	80～100 ℓ	1 回	雑草茎葉散布	北海道	1 回
			春期経年草地のギシギシ類の栄養生長期但し、採草14日前まで	200～300 ml					
			秋期新播草地のギシギシ類の栄養生長期但し、最終採草後						
			秋～春期（9～5月）ギシギシ類の展葉時期但し、採草14日前まで	400～600 ml					
			早春～秋期（1～11月）ギシギシ類の展葉時期	50～80倍液とし雑草が充分ぬれる量					
	牧野、草地（更新・造成）	ワラビ	ワラビ展葉期	1000～1500 ml	80～100 ℓ		雑草茎葉散布	—	

〔取扱メーカー〕 石原