

トルブロカルブ粒剤 ゴウケツ粒剤	取扱メーカー： 北興 原体メーカー： 三井アグロ
成分： トルブロカルブ〔MBI-P〕……………3.0%	性状： 類白色細粒 毒性： 普通物 消防法： —

【品目特性】 ……………

- 第3のメラニン合成阻害剤(PKS 阻害, MBI-P)に分類されており、従来の MBI-D 剤耐性菌や QoI 剤耐性菌にも有効である。
- 浸透移行性に優れる。
- 土壌の影響をうけにくい。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

【使用上のポイント】 ……………

- 散布後 7 日間は落水、かけ流しはしない。
- 水深 3 cm 程度の湛水状態を少なくとも 4～5 日間は保つ。
- 散布最適期は出穂 14～10 日前である。葉いもちの発生が確認できる場合は早めの散布を心掛ける。
- 種子消毒、育苗箱処理と適切に組み合わせた体系処理により効果が安定する。

【適用と使用法】 ……………

作物名	適用病害名	10 a 当り 使用量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	トルブロカルブを含む 農薬の総使用回数
稲	いもち病	3～4kg	出穂5日前まで 但し、収穫 30日前まで	1 回	湛水散布	2回以内 (移植時までの処理 は1回以内、本田で の湛水散布、無人航 空機散布、投げ入れ は合計1回以内)
	もみ枯細菌病	3kg				