

| | |
|--|--|
| ボスカリド水和剤 カンタスドライフロアブル | 取扱メーカー： B A S F，日本曹達* 原体メーカー： B A S F |
| 成分： ボスカリド〔カルボキサミド系〕……………50.0% | 性状： 褐色水和性微粒 毒性： 普通物 消防法： —— |

【品目特性】……………

- 灰色かび病，菌核病に卓効を示す。
- 既存の他殺菌剤とは異なる作用機作を持っているため，各種薬剤耐性菌にも有効である。
- 予防効果に優れ，また強い胞子形成阻害力を有し，二次感染を防ぐ。
- 残効性に優れる。
- 植物体葉表から葉裏への浸達性(translaminar)を有し，葉先及び葉縁への移行があるため，散布ムラによる病原菌の感染を防ぐ。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

【使用上のポイント】……………

- 発病前から発病初期の使用により安定した防除効果を発揮する。

- 過度の連用をさけ，作用性の異なる他剤との輪番で使用する。
- 散布液調製の際は，水をかきまぜながら本剤の所定量を徐々に加える。

【薬効・薬害等の注意】……………

- 散布量は，対象作物の生育段階，栽培形態及び散布方法に合わせ調節する。
- 適用作物（きゅうり）の薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。
- 果菜類・ぶどうに使用する場合，浸透性を高める効果のある展着剤や葉面液肥を加用すると薬害が生じるおそれがあるのでさける。

【安全対策上の注意】……………



【適用と使用法】

| 作物名 | 適用病害名 | 希釈倍数 | 10 a 当り 使用液量 | 使用時期 (収穫前) | 本剤の 使用回数 | 使用 方法 | ボスカリドを含む 農薬の総使用回数 | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------------------|--|--------|-------|-------|
| か ん き つ | 灰色かび病 | 1500 倍 | 200～700 ℓ | 14 日前まで | 3 回以内 | 散布 | 3 回以内 | | | | |
| 大粒種ぶどう | 灰色かび病 すす点病 | 1000～ 1500 倍 | | 7 日前まで | | | | | | | |
| 小 麦 | 眼紋病 | 1500 倍 | 60～150 ℓ | 45 日前まで | 2 回以内 | | 2 回以内 | | | | |
| い ち ご | 灰色かび病 | 1000～ 1500 倍 | 100～300 ℓ | 前日まで | 3 回以内 | | 3 回以内 | | | | |
| ト マ ト | 灰色かび病 | | | | | | | | | | |
| ミニトマト | 菌核病 | | | | | | | | | | |
| | 葉かび病 | | | | | | | | | | |
| な す | 灰色かび病 | | | | | | | | | | |
| | 菌核病 | | | | | | | | | | |
| | すすかび病 | | | | | | | | | | |
| き ゅ う り | 灰色かび病 | 1500 倍 | | | | | | | | | |
| | 菌核病 | | | | | | | | | | |
| | 褐斑病 | | | | | | | | | | |
| メ ロ ン | 菌核病 | 1000～ 1500 倍 | | 14 日前まで | | | | | | | |
| す い か | 菌核病 | | | | | | | | | | |
| に ん じ ん | 黒葉枯病 斑点病 | | | 7 日前まで | | | | | | | |
| レ タ ス | 灰色かび病 | 1500 倍 | | 7 日前まで | 14 日前まで | | 2 回以内 | 2 回以内 | | | |
| 非結球レタス | 菌核病 | | | | | | | | | | |
| くきちしゃ | 菌核病 | 1500 倍 | | 7 日前まで | | | 1 回 | 1 回 | | | |
| エンダイブ | 菌核病 | | | | | | 2 回以内 | | | | |
| ト レ ビ ス | 菌核病 | | | | | | 1 回 | | | | |
| キ ャ ペ ツ | 菌核病 株腐病 黒斑病 | 1500 倍 | | | | | 2 回以内 | 2 回以内 | | | |
| な ば な | 菌核病 | | | | | | | | 1 回 | | |
| た ま ね ぎ | 灰色かび病 灰色腐敗病 | 1000～ 1500 倍 | | 前日まで | | | 3 回以内 | 4 回以内 (定植前は 1 回以内, 定植後は 3 回以内) | | | |
| | 小菌核病 | 1500 倍 | | | | | | | 7 日前まで | | 3 回以内 |
| 豆類(種実,但し, らっかせい,あずき, いんげんまめを除く) | 菌核病 | 1500 倍 | | 21 日前まで | 2 回以内 | | 2 回以内 | | | | |
| あ ず き | 灰色かび病 菌核病 | 1000～ 1500 倍 | | | | | | 前日まで | 3 回以内 | 3 回以内 | |
| | さび病 | 1500 倍 | | 7 日前まで | 2 回以内 | | 2 回以内 | | | | |
| いんげんまめ | 灰色かび病 | 1000～ 1500 倍 | | | | | | 前日まで | 3 回以内 | 3 回以内 | |
| さやいんげん | 菌核病 | 1500 倍 | | 7 日前まで | 2 回以内 | | 2 回以内 | | | | |
| 未成熟そらまめ | 赤色斑点病 さび病 | 1000 倍 | | | | | | 前日まで | 3 回以内 | 3 回以内 | |
| さやえんどう 実 え ん ど う | 灰色かび病 | | | 1500 倍 | 7 日前まで | | 2 回以内 | | | | 2 回以内 |
| ブロッコリー | 菌核病 | 1000～ 1500 倍 | | | | | | 7 日前まで | 2 回以内 | 2 回以内 | |
| ら っ き ょ う | 灰色かび病 | | | 1000 倍 | 7 日前まで | | 2 回以内 | | | | 2 回以内 |
| ビ ー マ ン | 灰色かび病 | 1000 倍 | | | | | | 7 日前まで | 2 回以内 | 2 回以内 | |
| とうがらし類 | 黒枯病 | | | 1000 倍 | 7 日前まで | | 2 回以内 | | | | 2 回以内 |
| 食 用 ぎ く | 灰色かび病 | 1500 倍 | | | | | | 7 日前まで | 2 回以内 | 2 回以内 | |
| ブンタレッラ | 灰色かび病 | | | 1500 倍 | 3 日前まで | | | | | | |