

ブプロフェジン粒剤 アプロード粒剤	取扱メーカー： 日農 原体メーカー： 日農
成分： ブプロフェジン〔IGR（脱皮阻害剤）PRTR・1種〕…2.0%	性状： 淡褐色細粒 毒性： 普通物 消防法： —

【品目特性】

- セジロウンカ、トビイロウンカの幼虫対象施用剤である。
- 捕食性天敵のクモへの影響が極めて少ない。
- 手まきで簡便に散布できる。
- アプロード水和剤の項参照。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

【使用上のポイント】

- 散布に当たっては、田水深を3cm以上にし、散布後少なくとも3～4日間は湛水状態を保ち、散布後7日間は落水、かけ流しはしない。また、漏水の激しい水田では効果の劣る場合があるので使用をさける。
- 散布する場合、浮き草や雑草が繁茂している水田では、効果の劣ることがあるので、あらかじめ除草をしてから散布する。

【薬効・薬害等の注意】

- 成虫を直接殺す作用がないので幼虫主体の時期に散布する。また薬剤散布後も幼虫は直ちに死亡せず、死亡までに3～7日を要するので十分留意する。
- 成虫の防除を必要とする場合には成虫に有効な薬剤と組み合わせて使用する。
- 散布適期は、本剤の性質から害虫発生初期の比較的低密度の時期であり、多発時の散布は直ちに密度を低下させることができないので、その場合は速効性のある薬剤と組み合わせて使用する。

【安全対策上の注意】

- 魚類に影響を及ぼすので、使用時は注意。



【適用と使用法】

作物名	適用害虫名	10 a 当り 使用量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用方法	ブプロフェジンを含む 農薬の総使用回数
稲	ウンカ類幼虫	3～4 kg	7日前まで	4回以内	湛水散布	4回以内 (小包装投入は1回以内)