

<p>ペルメトリン水和剤 アディオフロアブル</p>	<p>取扱メーカー： 協友アグリ，サンケイ*， 三井アグロ，ホクサン，住友化学 原体メーカー： 住友化学</p>
<p>成分：ペルメトリン〔ピレスロイド系 PRTR・1 種〕………10.0%</p>	<p>性状：類白色水和性粘稠懸濁液体 毒性：普通物 消防法：——</p>

【品目特性】 ……………

- アディオ水和剤の項参照。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。
- 散布液の沈殿がなく，作物に対する汚れの心配がほとんどない。

【使用上のポイント】 ……………

- アディオ水和剤の項参照。

【薬効・薬害等の注意】 ……………

- アディオ水和剤の項参照。
- 使用前によく振ってから使用する。

【安全対策上の注意】 ……………

- 共通注意事項 6. 街路・公園・堤とう等で使用する場合は注意事項を参照。
- 共通注意事項 7. ミツバチに対する注意事項を参照。
- 魚類に強い影響を及ぼすおそれがあるので特に注意。
- 甲殻類に影響を及ぼすおそれがあるので，使用時は注意。



【適用と使用法】

作物名	適用害虫名	希釈倍数	10 a 当り 使用液量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用 方法	ベルメトリンを含む 農薬の総使用回数	
大粒種ぶどう	チャノキイロアザミウマ	1000～ 2000倍	200～ 700 ℓ	7 日前 まで	5 回以内	散布	5 回以内	
	コガネムシ類 フタテンヒメヨコバイ	1500倍						
おうとう	オウトウハマダラミバエ ショウジョウバエ	2000倍		前日まで	2 回以内		2 回以内	
りんご	キンモンホソガ	1500～ 2000倍		14 日前 まで	2 回以内		4 回以内 (散布は2回 以内、噴射 は2回以内)	
	ケムシ類 アブラムシ類 ハマキムシ類 モモチョッキリゾウムシ シンクイムシ類	1500倍						
	マルメロ							シンクイムシ類
	なし							カメムシ類 シンクイムシ類
アブラムシ類 モモハモグリガ				1500～ 2000倍				
もも	アブラムシ類 シンクイムシ類	1500倍		7 日前 まで	2 回以内		2 回以内	
くるみ	アメリカシロヒトリ シロテンクロマイコガ							
すもも	アブラムシ類 シンクイムシ類			前日まで	5 回以内		3 回以内	
ブルーベリー	オウトウショウジョウバエ			2000倍	7 日前 まで		5 回以内	5 回以内
かき	アザミウマ類 カメムシ類	1000～ 1500倍		前日まで	3 回以内		3 回以内	
アスパラガス	ヨトウムシ ハスモンヨトウ	1500倍	100～ 500 ℓ	—	6 回以内	6 回以内		
きくばら カーネーション	アブラムシ類		100～ 300 ℓ					
宿根かすみそう	アブラムシ類 ヨトウムシ			200～ 700 ℓ				
スターチス	ヨトウムシ							
りんどう	リンドウホソハマキ							
トルコギキョウ	ヒラズハナアザミウマ							
つつじ類	ツツジグンバイ							