

ピリミノバックメチル粒剤 ワンステージ1キログラム粒剤	取扱メーカー： 日農 原体メーカー： クミカ
成分： ピリミノバックメチル〔ピリミジニルカルボン酸系 PRTR・1種〕…1.2%	性状： 類白色細粒 毒性： 普通物 消防法： —

【品目特性】

- ノビエに対して強力な殺草効果がある。
- 土壌処理効果があり、長期間ノビエの発生を抑える。
- 稲・ヒエ間には優れた選択性があり、稲に対して高い安全性を示す。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

【使用上のポイント】

- 共通注意事項の5. 水稲除草剤散布 使用上のポイントを参照。
- ノビエの発生前から4葉期に有効なので時期を失ないように散布する。

【薬効・薬害等の注意】

- 直播水稲に使用する場合は次の事項に注意する。
 - 稲の根が露出した条件では薬害を生じるおそれがあるので使用をさける。

○稲の出芽後から3葉期未満では薬害を生じるおそれがあるので使用をさける。

○稲の3葉期以降に使用する場合は除草効果の低下と生育抑制の薬害が発生するおそれがあるので、入水後水持ちの安定した後に散布する。

●共通注意事項の5. 水稲除草剤散布 薬効・薬害等の注意を参照。

●適用作物（稲）への薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。

●適用外作物（せり、くわい）の薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。

【安全対策上の注意】

●眼に対して刺激性があるので、眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受ける。

●カブレやすい体質の人は取扱いに十分注意する。

●蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにする。

●無人ヘリコプター散布の際は、共通注意事項の2. 空中散布及び無人航空機（無人ヘリコプター等）による散布・滴下に関する注意事項を参照。

【適用と使用法】

作物名	適用雑草名	使用時期	10 a 当り 使用量	使用方法	本剤の 使用回数
移植水稲	ノビエ	移植後15日～ノビエ4葉期 但し、 収穫45日前まで	1 kg	湛水散布又は 無人ヘリコプター による散布	1回※
		稲3葉期～ノビエ4葉期 但し、 収穫45日前まで			
直播水稲		は種時	0.5～1 kg	は種同時散布機で 施用	
		は種直後			
		は種直後～稲出芽前	1 kg	落水散布又はごく 浅く湛水して散布	

※ピリミノバックメチルを含む農薬の総使用回数：2回以内