

ジノテフラン・シメコナゾール・トルプロカルブ粒剤 ゴウケツモンスター粒剤	取扱メーカー： 北興 原体メーカー： 三井アグロ、三井アグロ、三井アグロ
成分： ジノテフラン〔ネオニコチノイド系〕……………1.67% シメコナゾール〔エルゴステロール生合成阻害剤〕…1.5% トルプロカルブ〔MBI-P〕……………3.0%	性状： 類白色細粒 毒性： 普通物 消防法： ——

【適用と使用方法】 ……………

作物名	適用病害虫名	10 a 当り 使用量	使用時期	使用 方法	総使用回数
稲	いもち病 紋枯病 稲こうじ病 もみ枯細菌病 穂枯れ(ごま葉枯病菌) 墨黒穂病 ウンカ類 ツマグロヨコバイ カメムシ類 フタオビコヤガ	3kg	出穂5日前 まで 但し、収穫 45日前まで	湛水 散布	本剤 1回 ジノテフラン 4回以内 (育苗箱への処理及び側条施用 は合計1回以内、本田での散布、 空中散布、無人航空機散布は合 計3回以内) シメコナゾール 2回以内 (移植時までの処理は1回以内) トルプロカルブ 2回以内 (移植時までの処理は1回以内、 本田での湛水散布、無人航空 機散布、投げ入れは合計1回以 内)