フィプロニル・チフルザミド・プロベナゾール粒剤

ビルダープリンスグレータム粒剤

取扱メーカー: 北興, Meiji

原体メーカー:

BASF, 日産, Meiji

成分: フィプロニル〔フェニルピラゾール系 PRTR・1種〕…1.0% チフルザミド〔酸アミド系〕………………3.0% プロベナゾール…………………10.0% 性状:類白色細粒

毒性:普通物 消防法:——

作物名	適用病害虫名	1箱*当り 使用量	使用時期	使用方法	総使用回数
稲(箱育苗)	いもち病 紋枯病 ウンカ類 コブノメイガ ニカメイチュウ イネツトムシ 白葉枯病	50 g	緑化期~ 移植当日	育苗箱の苗の 上から均一に 散布する。	本剤 1回 フィプロニル 1回 チフルザミド 3回以内 (移植時までの処理は1 回以内,本田では2回以 内) プロベナゾール 2回以内 (移植時までの処理は1 回以内)
	もみ枯細菌病 内類褐変病 穂枯れ (ごま葉枯病菌) イネドロオイムシ イネミズゾウムシ イネヒメハモグリバエ イネクロカメムシ イネアザミウマ		移植3日前 ~移植当日		

*育苗箱は30×60×3 cm, 使用土壌約5 ℓ