

イソプロチオラン粒剤 フジワン1キロ粒剤	取扱メーカー： 協友アグリ，日農 原体メーカー： 日農
成分： イソプロチオラン〔ジチオラン系 PRTR・1種〕…36.0%	性状： 類白色細粒 毒性： 普通物 消防法： —

【品目特性】

- 土壌種の影響を受け難く穂いもちに対して安定した効果が持続するとともに，稲こうじ病を同時防除できる。
- 低温，日照不足や高温等の不良環境下では稔実しにくい，もみの登熟を高める登熟歩合向上効果がある。
- 無人ヘリコプターでの散布にも使用できる。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

【使用上のポイント】

- 田水深3cm以上の湛水状態とし，散布後3～4日間は湛水状態を保ち，散布後7日間は落水，かけ流しはしない。極端な漏水田での使用はさける。
- 予防的に散布した場合に有効であり，葉いもち防除の使用適期は初発の7～10日前である。発生予察情報に注意して時期を失しないように早目に散布する。穂いもち防除の使用適期は出穂20日前（葉いもちの発病程度，気象条件などにより出穂10～30日前）である。なお，本剤の使用適期は稲の品種あるいは地域により前後することがあり，また多発時の散布は効果が劣る場合があるので，使用に当っては使用時期を誤らないように病虫害防除所等関係機関の指導を受ける。
- 稲の登熟歩合向上を目的として使用する場合は，低温や高温等生育不良条件下で効果的であるので，これらの条件下で使用する事が望ましい。

【薬効・薬害等の注意】

- 朝露や降雨により葉が濡れている場合は，粒剤が直接葉に付着して薬害を生じるおそれがあるので使用をさける。
- 育苗箱には使用しない。

【安全対策上の注意】

- 蚕に対して影響があるので，周辺の桑葉にはかからないようにする。
- 眼に対して刺激性がある。
- 皮膚に対して弱い刺激性がある。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯する。
- 魚類に影響を及ぼすので，使用时並びに使用後は注意。
- 無人ヘリコプター散布の際は，共通注意事項の2．空中散布及び無人航空機（無人ヘリコプター等）による散布・滴下に関する注意事項を参照。



【適用と使用法】

作物名	適用病害名	10 a 当り 使用量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	イソプロチオランを 含む農薬の総使用回数
稲	稲こうじ病	1 kg	出穂10～30日前 但し、 収穫30日前まで	2回以内	湛水散布	3回以内 (移植前は1回 以内、本田では 2回以内)
	いもち病	1～1.5 kg	葉いもちに対しては 初発7～10日前 穂いもちに対しては 出穂10～30日前 但し、収穫30日前 まで		無人ヘリコプ ターによる散 布	

作物名	使用目的	10 a 当り 使用量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	イソプロチオランを 含む農薬の総使用回数
稲	登熟歩合向上	1 kg	出穂10～20日前 但し、収穫30日前 まで	1回	湛水散布	3回以内 (移植前は1回以内、 本田では2回以内)