

テニルクロール・ベンスルフロンメチル水和剤 クサメツツフロアブル	取扱メーカー： 日農，一農 原体メーカー： エス・ディー・エス，クミカ
成分： テニルクロール〔酸アミド系〕……………5.0% ベンスルフロンメチル〔スルホニルウレア系〕……………1.0%	性状： 類白色水和性粘稠懸濁液体 毒性： 普通物 消防法： ——

【品目特性】……………

- ノビエ（2葉期まで）や広範な広葉雑草に卓効を示す初期一発剤である。
- ボトル容器入原液を直接田面に散布するので作業時間・労力とも大幅に軽減される。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

【使用上のポイント】……………

- 共通注意事項の5，水稻除草剤散布 使用上のポイントを参照。
- 多年生雑草は生育段階によって効果にフレが出るので必ず適期に散布する。

雑草名	散布適期
ホタルイ ウリカワ ミズガヤツリ	2葉期まで
クログワイ オモダカ	発生始期まで
ヒルムシロ	発生期まで
セリ	増殖初期まで
アオミドロ・藻類による表層はく離	発生始期まで

- 雑草の発生前から発生始期に有効なので移植後ノビエの2葉期までに散布する。
- クログワイ，オモダカに対しては有効な後処理剤と組み合わせて使用する。

【薬効・薬害等の注意】……………

- 共通注意事項の5，水稻除草剤散布 薬効・薬害等の注意を参照。
- 適用作物（水稻）の薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。散布後の著しい高温による場合は一過性のもので次第に回復する。
- 適用外作物（いぐさ，れんこん，せり，くわい）への薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。隣接田で使用する場合は十分注意する。

【安全対策上の注意】……………

- 無人ヘリコプター滴下の際は，共通注意事項の2，空中散布及び無人航空機（無人ヘリコプター等）による散布・滴下に関する注意事項を参照。
- 魚類に影響を及ぼすので，使用時は注意。
- 藻類に影響を及ぼすので，使用時並びに使用後も注意。
- 散布器具・容器の洗浄水及び空容器は適切に処理する。

【適用と使用法】

作物名	適用雑草名	適用土壌	使用時期	10 a 当り 使用量	使用方法	適用地帯	本剤の 使用回数
移 植 水 稲	水田一年生雑草 マツバイ ホタルイ ウリカワ ミズガヤツリ オモダカ ヒルムシロ セリ クログワイ アオミドロ・藻類 による表層はく離	壤土～埴土	移植直後～ ノビエ2葉期 但し、 移植後30日まで	500 ml	原液湛水 散布，水 口施用 又は無人 ヘリコプ ターによ る滴下	全域(北海道， 東北を除く) の普通期及び 早期栽培地帯	1 回 ※
		砂壤土	移植後5日～ ノビエ2葉期 但し、 移植後30日まで				

※テニルクロールを含む農薬の総使用回数 ：2回以内

※ベンスルフロンメチルを含む農薬の総使用回数：2回以内