

ハロスルフロンメチル水和剤 シャドー水和剤	取扱メーカー： 日産 原体メーカー： 日産
成分： ハロスルフロンメチル〔スルホニルウレア系 PRTR・1種〕…5.0%	性状： 類白色水和性粉末45 μ m以下 毒性： 普通物 消防法： —

【品目特性】

- 防除が困難で近年問題となっている，強害雑草のイチビ・ショクヨウガヤツリ（キハマスゲ）・ハマスゲに高い効果を有する。
- 発生後から5葉期までの雑草に有効なので，雑草の発生を見てからの散布が可能。
- 対象作物に対して高い選択性を有しているため，作物にかからないように散布するわずらわしさが少ない。
- 有効成分の特性は参考資料の「有効成分特性一覧表」を参照。

【使用上のポイント】

- イネ科雑草に効果が期待できないので，これらの雑草に有効な除草剤との体系で使用する。

【薬効・薬害等の注意】

- 有機リン系殺虫剤との混用及び7日以内の近接散布は，薬害を生じることがあるのでさける。
- 全面散布する場合は，雑草茎葉にかかるよう，まきむらのないように均一に散布する。
- 適用作物（飼料用とうもろこし）の薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。
- 適用外作物（スイートコーン，てんさい，あぶらな科作物，いぐさ，れんこん，せり，くわい）への薬害などの注意は「薬害注意事項解説」を参照。
- 使用後短期間内に適用作物以外のは種はさける。
- 使用後，タンク，ホース，ノズル内に薬液が残らないよう散布器具は十分に洗浄し，他の用途に使用する場合，薬害の原因にならないよう注意する。
- 適用雑草キクイモに散布した場合，塊茎が残る場合があるが，食用又は飼料用に供さない。
- 生育初期のキクイモに対しては，効果が劣ることがある。

【安全対策上の注意】

- 藻類に影響を及ぼすので，使用時並びに使用後も注意。
- 散布器具・容器の洗浄水及び空容器は適切に処理する。

【適用と使用法】

作物名	適用雑草名	使用時期	10 a 当り使用量		本剤の 使用回数	使用方法	ハロシ/フロンメチルを 含む農薬の使用回数
			薬量	希釈水量			
飼料用 とうもろこし	一年生及び 多年生広葉雑草	一年生及び多年生広 葉雑草 2～5 葉期 (とうもろこし 3～5 葉期)	50 ～ 75g	100 ℓ	1 回		1 回
	キクイモ	キクイモ生育期 (とうもろこし 5 葉期)					
さとうきび 飼料用さとうきび	一年生広葉雑草	一年生広葉雑草 3～5 葉期 (さとう きび生育初期) 但し、 収穫 90 日前まで	150 ～ 200g		2 回 以内	雑草茎葉 散布 又は 全面散布	2 回以内
	ハマスゲ	ハマスゲ 3～5 葉期 但し、 収穫 90 日前まで	100 ～ 200g				
直播水稻	一年生広葉雑草 マツバイ ホタルイ ミズガヤツリ ウリカワ ヒルムシロ セリ	乾田直播の 入水 10～2 日前 (稲 2 葉期以降、 雑草草丈 30 cm 以下)	90 ～ 180g		1 回	雑草茎葉 散布 又は 全面土壌 散布	