

# ベトファイター顆粒水和剤

成分：シモキサニル〔シアノアセトアミド系 PRTR・1種〕……24.0%

ベンチアバリカルブイソプロピル〔アミノ酸アミドカーバメート系〕……10.0%

毒性：普通物

## 【適用と使用方法】

作物名	適用 病害名	希釈倍数	10 a 当り 使用液量	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用 方法	シモキサニルを含む 農業の総使用回数	ベンチアバリカルブ イソプロピルを含む 農業の総使用回数
ぶ ど う	べと病	2000～ 3000倍	200～ 700 ℓ	30 日前まで	3回以内	散布	3回以内	3回以内
きゅうり				前日まで				
メ ロ ン				3 日前まで				
す い か	褐色腐敗病	2000 倍	100～ 300 ℓ	14 日前まで			4回以内	3回以内
かぼちゃ	疫病			7 日前まで			3回以内	
ね ぎ	べと病			前日まで				
たまねぎ	べと病 白色疫病			14 日前まで				
ト マ ト	疫病							
ミニトマト	白色疫病							
らっきょう	茎疫病				2回以内			2回以内
だ い ず	べと病			2000～ 3000倍	7 日前まで		4回以内	5回以内
ばれいしょ	疫病	1500～ 2000倍	100～ 180 ℓ	10 日前まで	2回以内		2回以内	2回以内
た ば こ		2000～ 3000倍						

〔取扱メーカー〕 日本曹達